


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده: شیمی

گروه: شیمی آلی

سنتز ۱، ۲، ۳-تری آزول‌های جدید از ترکیبات استیلنی تری آزین و بنزوتري آزین

مصطفی لطفی

اساتید راهنما :

دکتر علی کیوانلو

استاد مشاور:

دکتر محمد باخرد

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

دی ماه ۱۳۹۴

الهی!

تو را سپاس به خاطر توفیق آگاهی که به من عطا نمودی. خدایا به من قدرتی عطا کن که به استقبال آینده‌ای روشن پیش روم، صبر، مرحمت فرما تا در سختی‌های روزگار همواره بکوشم.

با توجه به عنایات خاصه خداوند متعال، مساعدت و یاری خانواده عزیز، اساتید بزرگوار و دوستان خوبم، اکنون که پایان نامه خود را به پایان رسانده‌ام بر خود لازم می‌دانم تا در کمال ادب و احترام مراتب سپاس و قدردانی خالصانه و صمیمانه را از همه کسانی که من را در این پایان نامه یاری نموده‌اند ابراز داشته و کمال تشکر و امتنان را دارم. همچنین از خداوند متعال توفیق و سعادت همه‌ی پویندگان علم و دانش را خواهانم.

در ابتدا زحمات بی دریغ و حمایت‌های پدر، مادر و خواهر عزیزم را ارج می‌نهم که در طول دوران تحصیل، همواره موجب دلگرمی و آسودگی خاطر برایم بوده‌اند و بی شک در سایه‌ی حمایت‌های آنها امروز مرحله علمی دیگری را با موفقیت به پایان رسانده‌ام. در انتها از همراهی و همکاری کارکنان دانشکده شیمی که در این راه مرا یاری نموده‌اند کمال تشکر را دارم.

همچنین از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر کیوانلو که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننموده و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند کمال تشکر و قدر دانی را دارم.

تعهد نامه

اینجانب **مصطفی لطفی** دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان نامه **سنّتز ۳،۲،۱-تری آزول‌های جدید از ترکیبات استیلنی‌تری آزین و بنزوتری آزین** تحت راهنمایی **دکتر علی کیوانلو** متعهد می شوم.

- تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
- در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
- مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.
- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقالات مستخرج با نام « دانشگاه صنعتی شاهرود» و یا «Shahrood University of Technology» به چاپ خواهد رسید.
- حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقالات مستخرج از پایان نامه رعایت می گردد.
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده (یا بافتهای آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است.

تاریخ

امضای دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر

- کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزار ها و تجهیزات ساخته شده است) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
- استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.

چکیده

در این پروژه ابتدا از واکنش ۶-متیل-۳-تیواکسو-۴،۳-دی‌هیدرو-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵-(۴H)-اون و ۲،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین-۳-(۴H)-تیون، با پروپارژیل برمید به ترتیب ترکیب‌های ۶-متیل-۳-(پروپ-۲-اینیل‌تیو)-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵-(۴H)-اون و ۳-(پروپ-۲-اینیل‌تیو)-۴،۱-تری‌آزین-۵-(۴H)-اون و ۴،۲،۱-تری‌آزین بدست آمد. در ادامه از واکنش این ترکیبات با آزیدهای آروماتیک و یا به صورت سه جزئی با سدیم آزید و هالیدهای آلیفاتیک در حضور کاتالیزگر مس(II) استات و سدیم آسکوربات در حلال DMF ترکیبات جدید ۳،۲،۱-تری‌آزول‌های متصل شده به حلقه هتروسیکلی ۴،۲،۱-تری‌آزین و ۴،۲،۱-بنزوتتری‌آزین با بهره بالا سنتز شد.

کلمات کلیدی: ۳،۲،۱-تری‌آزول، مس(II) استات، سدیم آزید، ۴،۲،۱-تری‌آزین، هالید آلیفاتیک.

فهرست

(۱) مقدمه: ----- ۲

(۱-۱) شیمی کلیک ----- ۲

(۱-۱-۱) طبقه بندی واکنش های کلیک: ----- ۴

(۲-۱-۱) واکنش حلقه زایی هویزگن: ----- ۶

(۲-۱) شیمی ۳،۲،۱-تری آزول ها ----- ۷

(۱-۲-۱) واکنش حلقه زایی آزید-آلکین کاتالیز شده با مس (CuAAC) ----- ۱۰

(۱-۲-۱) مکانیسم واکنش حلقه زایی آزید-آلکین کاتالیز شده با مس (CuAAC) ----- ۱۱

(۲-۲-۱) سنتز ۳،۲،۱-تری آزول ها ----- ۱۲

(۲) بحث و بررسی نتایج ----- ۱۸

(۱-۲) سنتز مشتقات جدید ۶-متیل-۳- $\{(1-آریل-1H-3,2,1-تری آزول-4-ایل)متیل تیو\}$ -۴،۲،۱-تری

آزین-۵(۴H)-اون ----- ۲۰

(۱-۲-۲) بهینه کردن سنتز مشتقات ۶-متیل-۳- $\{(1-آریل-1H-3,2,1-تری آزول-4-ایل)متیل تیو\}$ -۴،۲،۱-تری

آزین-۵(۴H)-اون ----- ۲۱

(۲-۲) سنتز مشتقات جدید ۳- $\{(1-آریل-1H-3,2,1-تری آزول-4-ایل)متیل تیو\}$ -۴،۱-دی هیدروبنزو

[e]-۴،۲،۱-تری آزین ----- ۲۴

(۱-۲-۲) بهینه کردن سنتز مشتقات ۳- $\{(1-آریل-1H-3,2,1-تری آزول-4-ایل)متیل تیو\}$ -۴،۱-

دی هیدروبنزو [e]-۴،۲،۱-تری آزین ----- ۲۵

(۳-۲) سنتز سه جزئی مشتقات ۶-متیل-۳- $\{(1-آریل-1H-3,2,1-تری آزول-4-ایل)متیل تیو\}$ -

۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-اون ----- ۲۸

- ۴-۲) سنتز سه جزئی مشتقات ۳- { (۱-آریل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو }-۴،۱-دی
 هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین ----- ۳۰
- ۵-۲) شواهد طیفی مشتقات ۶-متیل-۳- { (۱-آریل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو }-۴،۲،۱-
 تری آزین-۵(۴H)-اون ----- ۳۳
- ۵-۲ (۱-۶-متیل-۳- { (۱-فنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو }-۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-اون (۵۵a)
 ----- ۳۳
- ۵-۲ (۲-۶-متیل-۳- { (۱-۲-نیتروفنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو }-۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-
 اون (۵۵b) ----- ۳۳
- ۵-۲ (۳-۶-متیل-۳- { (۱-۳-نیتروفنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو }-۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-
 اون (۵۵c) ----- ۳۴
- ۵-۲ (۴-۶-متیل-۳- { (۱-۴-نیتروفنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو }-۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-
 اون (۵۵d) ----- ۳۵
- ۵-۲ (۵-۶-متیل-۳- { (۱-۳-کلروفنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو }-۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-
 اون (۵۵e) ----- ۳۵
- ۵-۲ (۶-۶-متیل-۳- { (۱-۴-نیترو-۳-کلروفنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو }-۴،۲،۱-تری آزین-
 ۵(۴H)-اون (۵۵f) ----- ۳۶
- ۵-۲ (۷-۴-۴-۶-متیل-۵-اکسو-۵،۴-دی هیدرو-۴،۲،۱-تری آزین-۳-ایل تیو)-متیل { ۱H-۳،۲،۱-تری آزول-
 ۱-ایل)-بنزوئیک اسید (۵۵g) ----- ۳۷
- ۵-۲ (۸-۶-متیل-۳- { (۱-۲-اکسو پروپیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو }-۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-
 اون (۶۰a) ----- ۳۷
- ۵-۲ (۹-۶-متیل-۳- { (۱-۴-متیل بنزیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو }-۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-
 اون (۶۰b) ----- ۳۸
- ۵-۲ (۱۰-۶-متیل-۳- { (۱-۴-نیترو بنزیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو }-۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-
 اون (۶۰c) ----- ۳۸

۶-۲) شواهد طیفی مشتقات ۳- {۱-آریل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو {۴،۱-دی هیدروبنزو

[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۷) ----- ۳۹

۶-۲) ۱- {۱-فنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو {۴،۱-دی هیدروبنزو [e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۷a)

----- ۳۹

۶-۲) ۲- {۱-۲-نیتروفنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو {۴،۱-دی هیدروبنزو [e]-۴،۲،۱-تری

آزین (۵۷b) ----- ۴۰

۶-۲) ۳- {۱-۳-نیتروفنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو {۴،۱-دی هیدروبنزو [e]-۴،۲،۱-تری

آزین (۵۷c) ----- ۴۰

۶-۲) ۴- {۱-۴-نیتروفنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو {۴،۱-دی هیدروبنزو [e]-۴،۲،۱-تری

آزین (۵۷d) ----- ۴۱

۶-۲) ۵- {۱-۳-کلرو فنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو {۴،۱-دی هیدروبنزو [e]-۴،۲،۱-تری

آزین (۵۷e) ----- ۴۲

۶-۲) ۶- {۱-۴-کلرو-۳-نیتروفنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو {۴،۱-دی هیدروبنزو [e]-

۴،۲،۱-تری آزین (۵۷f) ----- ۴۲

۶-۲) ۷- ۴- (۴-۱-دی هیدرو [e]-۴،۲،۱-تری آزین-۳-ایل تیو)-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو-بنزوئیک

اسید (۵۷g) ----- ۴۳

۶-۲) ۸- {۱-۱-بنزیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو {۴،۱-دی هیدرو بنزو [e]-۴،۲،۱-تری آزین

(۶۱a) ----- ۴۳

۶-۲) ۹- {۱-۲-کلرو بنزیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو {۴،۱-دی هیدروبنزو [e]-۴،۲،۱-تری

آزین (۶۱b) ----- ۴۴

۶-۲) ۱۰- {۱-۴-متیل بنزیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو {۴،۱-دی هیدروبنزو [e]-۴،۲،۱-تری

آزین (۶۱c) ----- ۴۵

۶-۲) ۱۱- {۱-۱-متیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو {۴،۱-دی هیدروبنزو [e]-۴،۲،۱-تری آزین

(۶۱d) ----- ۴۵

۶-۲) ۱۲- ۴- (۴-۱-دی هیدرو [e]-۴،۲،۱-تری آزین-۳-ایل تیو)-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} متیل تیو-

- ۴۶----- پروپان-۲-ون (۶۱e)
- ۴۷----- ۷-۲ نتیجه گیری
- ۴۸----- ۸-۲ آینده نگری
- ۵۰----- ۳) بخش تجربی
- ۵۰----- ۱-۳) تکنیک‌های عمومی
- ۵۰----- ۱-۱-۳) مواد اولیه
- ۵۰----- ۲-۱-۳) دستگاه‌ها
- ۵۱----- ۲-۳) تهیه آزیدهای آروماتیک
- ۵۱----- ۱-۲-۳) سنتز آزیدهای آلی مایع
- ۵۱----- ۲-۲-۳) سنتز آزیدهای آلی جامد
- ۵۲----- ۳-۳) تهیه ۶-متیل-۳-تیواکسو-۴،۳-دی‌هیدرو-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵-(۴H)-اون (۶۴)
- ۵۲----- ۴-۳) تهیه ۶-متیل-۳-پروپ-۲-اینیل تیو-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵-(۴H)-اون (۵۳)
- ۵-۳) تهیه مشتقات ۶-متیل-۳- $\{(1-آریل-1H-3,2,1-تری‌آزول-4-ایل)-متیل تیو\}$ -۴،۲،۱-
- ۵۲----- تری‌آزین-۵-(۴H)-اون (۵۵)
- ۵۵----- ۶-۳) تهیه ۲،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۶۸)
- ۵۶----- ۷-۳) تهیه ۳-پروپ-۲-اینیل تیو-۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۶)
- ۸-۳) تهیه مشتقات ۳- $\{(1-آریل-1H-3,2,1-تری‌آزول-4-ایل)-متیل تیو\}$ -۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-
- ۵۶----- ۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۷)
- ۹-۳) تهیه مشتقات ۶-متیل-۳- $\{(1-آریل-1H-3,2,1-تری‌آزول-4-ایل)-متیل تیو\}$ -۴،۲،۱-
- ۵۹----- تری‌آزین-۵-(۴H)-اون (۶۰)
- ۱۰-۳) تهیه مشتقات ۳- $\{(1-آریل-1H-3,2,1-تری‌آزول-4-ایل)-متیل تیو\}$ -۱،۴-دی‌هیدروبنزو

۶۰-----[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۶۱)

۶۴ ----- (۴) ضمیمه

۱۱۰ ----- (۵) منابع

فهرست طرح‌ها

- طرح ۱-۱: واکنشهای شیمی کلیک [۹]..... ۳
- طرح ۲-۱: حلقه‌زایی هویزگن ۳،۱-دوقطبی آزید و آلکین انتهایی..... ۴
- طرح ۳-۱: بازشدن حلقه‌ی هتروسیکلی توسط حمله هسته‌دوست..... ۴
- طرح ۴-۱: تشکیل هیدرازون / اکسیم اتر..... ۵
- طرح ۵-۱: تشکیل آمید / ایزو اوره..... ۵
- طرح ۶-۱: تشکیل حلقه‌های سه‌تایی..... ۵
- طرح ۷-۱: واکنش‌های افزایشی پیوندهای چندگانه کربن-کربن..... ۵
- طرح ۸-۱: واکنش هویزگن در غیاب و حضور کاتالیزگر..... ۷
- طرح ۹-۱: نمونه ای از برخی مشتق‌های ۳،۲،۱-تری‌آزول‌های فعال بیولوژیکی..... ۹
- طرح ۱۰-۱: استفاده از تری‌آزول‌ها به عنوان یک سنسور چند سیگنالی برای شناسایی Hg^{2+} و کاربرد در سلول تصویر برداری زنده [۴۹]..... ۱۰
- طرح ۱۱-۱: کمپلکس‌های ایردیوم نشر کننده‌ی نور و نقش تری‌آزول‌ها در آن [۵۲]..... ۱۰
- طرح ۱۲-۱: مکانیسم واکنش (CuAAC)..... ۱۲
- طرح ۱۳-۱: تولید رادیو دارو با استفاده از شیمی کلیک..... ۱۳
- طرح ۱۴-۱: سنتز برس‌های پلیمری با استفاده از شیمی کلیک [۶۸]..... ۱۳

- طرح ۱-۱۵: استفاده از مایکروویو در سنتز ۳،۲،۱-تری‌آزول‌ها ۱۴
- طرح ۱-۱۶: سنتز ۳،۲،۱-تری‌آزول‌ها با استفاده از دی‌آزوسیون آمین‌های آروماتیک به عنوان پیش ماده آزید ۱۴
- طرح ۱-۱۷: کاربرد همزمان تابش امواج مایکروویو و تابش فرا صوت برای واکنش CuAAC ۱۵
- طرح ۱-۱۸: واکنش CuAAC با استفاده از مایع یونی و آب به عنوان حلال ۱۶
- طرح ۱-۱۹: واکنش CuAAC با استفاده از مایع یونی به عنوان حلال ۱۶
- طرح ۱-۲۰: سنتز β -هیدروکسیتی‌تری‌آزول‌ها از واکنش بین اپوکسیدها، سدیم آزید و آلکین‌ها ۱۶
- طرح ۲-۱: سنتز مشتقات جدید ۳،۲،۱-تری‌آزول‌های متصل به حلقه‌های ۴،۲،۱-تری‌آزین و ۴،۲،۱-بنزوتتری‌آزین ۱۹
- طرح ۲-۲: سنتز سه جزئی تک ظرفی ۳،۲،۱-تری‌آزول‌های جدید بر پایه ۴،۲،۱-تری‌آزین و ۴،۲،۱-بنزوتتری‌آزین ۱۹
- طرح ۲-۳: سنتز ترکیب ۶-متیل-۳-(پروپ-۲-اینیل‌تیو)-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵-(۴H)-اون (۵۳) ۲۰
- طرح ۲-۴: سنتز آزیدهای آروماتیک ۲۰
- طرح ۲-۵: سنتز مشتقات جدید ۳،۲،۱-تری‌آزول‌های متصل به حلقه‌ی ۴،۲،۱-تری‌آزین ۲۱
- طرح ۲-۶: واکنش ۶-متیل-۳-(پروپ-۲-اینیل‌تیو)-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵-(۴H)-اون (۵۵) با ۱-آزیدو-۳-نیتروبنزن (۵۴c) در حضور کاتالیزگر و حلال در دماهای متفاوت ۲۱
- طرح ۲-۷: سنتز ترکیب ۳-(پروپ-۲-اینیل‌تیو)-۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین ۲۴
- طرح ۲-۸: سنتز مشتقات جدید ۳،۲،۱-تری‌آزول‌های متصل به حلقه‌ی ۴،۲،۱-بنزوتتری‌آزین ۲۴
- طرح ۲-۹: واکنش ۳-(پروپ-۲-اینیل‌تیو)-۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۶) با ۱-آزیدو-۳-نیتروبنزن (۵۴c) در حضور کاتالیزگر و حلال در دماهای متفاوت ۲۵
- طرح ۲-۱۰: واکنش ۶-متیل-۳-(پروپ-۲-اینیل‌تیو)-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵-(۴H)-اون (۵۳) با

- سدیم آزید (۵۸) و ۲-کلروبنزیل کلراید (۵۹c) در حضور کاتالیزگر و حلال در دماهای متفاوت ۲۸
- طرح ۱۱-۲: واکنش ۳-(پروپ-۲-اینیل تیو) ۴،۱-دی هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۶) با
- سدیم آزید (۵۸) و هالیدهای آلیفاتیک (۵۹) در حضور کاتالیز و حلال در دماهای متفاوت ۳۰

فهرست جدول‌ها

- جدول ۱-۲: بهینه کردن نوع کاتالیزگر، دما و حلال در واکنش (طرح ۲-۶) ۲۱
- جدول ۲-۲: نقطه ذوب، زمان و بهره‌ی واکنش سنتز مشتقات جدید ترکیب (۵۵) ۲۳
- جدول ۳-۲: بهینه کردن نوع و مقدار کاتالیزگر، دما، و حلال در واکنش (طرح ۲-۹) ۲۵
- جدول ۴-۲: نقطه ذوب، زمان و بهره واکنش سنتز مشتقات جدید ترکیب (۵۷) ۲۷
- جدول ۵-۲: بهینه کردن نوع کاتالیزگر، دما، و حلال در واکنش (طرح ۲-۱۰) ۲۸
- جدول ۶-۲: نقطه ذوب، زمان و بهره واکنش سنتز مشتقات جدیدی از ترکیب (۵۸) ۲۹
- جدول ۷-۲: بهینه کردن نوع کاتالیزگر، دما و حلال در واکنش (طرح ۲-۱۱) ۳۰
- جدول ۸-۲: بهینه کردن شرایط واکنش در اتانول مغناطیسی ۳۲
- جدول ۹-۲: نقطه ذوب، زمان و بهره واکنش سنتز مشتقات جدید ترکیب (۶۱) ۳۲

فهرست طیف‌ها

- طیف ۱-۴: طیف $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۵a) ۶۴
- طیف ۲-۴: طیف IR ترکیب شماره‌ی (۵۵a) ۶۵
- طیف ۳-۴: طیف $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۵b) ۶۶
- طیف ۴-۴: طیف IR ترکیب شماره‌ی (۵۵b) ۶۷

طیف ۵-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۵c)	۶۸
طیف ۶-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۵۵c)	۶۹
طیف ۷-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۵d)	۷۰
طیف ۸-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۵۵d)	۷۱
طیف ۹-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۵e)	۷۲
طیف ۱۰-۴: FT-IR ترکیب شماره‌ی (۵۵e)	۷۳
طیف ۱۱-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۵f)	۷۴
طیف ۱۲-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۵۵f)	۷۵
طیف ۱۳-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۵g)	۷۶
طیف ۱۴-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۵۵g)	۷۷
طیف ۱۵-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۶۰a)	۷۸
طیف ۱۶-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۶۰a)	۷۹
طیف ۱۷-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۶۰b)	۸۰
طیف ۱۸-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۶۰b)	۸۱
طیف ۱۹-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۶۰c)	۸۲
طیف ۲۰-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۶۰c)	۸۳
طیف ۲۱-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۷a)	۸۴
طیف ۲۲-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۵۷a)	۸۵
طیف ۲۳-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۷b)	۸۶
طیف ۲۴-۴: FT-IR ترکیب شماره‌ی (۵۷b)	۸۷
طیف ۲۵-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۷c)	۸۸

طیف ۲۶-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۵۷c).....	۸۹
طیف ۲۷-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۷d).....	۹۰
طیف ۲۸-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۵۷d).....	۹۱
طیف ۲۹-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۷e).....	۹۲
طیف ۳۰-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۵۷e).....	۹۳
طیف ۳۱-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۷f).....	۹۴
طیف ۳۲-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۵۷f).....	۹۵
طیف ۳۳-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۵۷g).....	۹۶
طیف ۳۴-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۵۷g).....	۹۷
طیف ۳۵-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۶۱a).....	۹۸
طیف ۳۶-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۶۱a).....	۹۹
طیف ۳۷-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۶۱b).....	۱۰۰
طیف ۳۸-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۶۱b).....	۱۰۱
طیف ۳۹-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۶۱c).....	۱۰۲
طیف ۴۰-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۶۱c).....	۱۰۳
طیف ۴۱-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۶۱d).....	۱۰۴
طیف ۴۲-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۶۱d).....	۱۰۵
طیف ۴۳-۴: $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۶۱e).....	۱۰۶
طیف ۴۴-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۶۱e).....	۱۰۷

فصل اول

مقدمه

(۱) مقدمه:

(۱-۱) شیمی کلیک

در سال‌های اخیر، شیمی کلیک^۱ به دلیل متصل کردن واحدهای کوچک به هم به یک واکنش بسیار مهم تبدیل شده است [۱]. شیمی کلیک کاربردهای گسترده‌ای در داروسازی [۲]، شیمی ترکیبی^۲ [۳]، سنتز مولکول‌های هدف در شیمی آلی [۴]، اتصال به DNA و پروتئین [۵] و در واکنش‌های اتصال دهنده‌ی ساختارهای زیستی [۶] دارد.

در سال ۲۰۰۱ کلب^۳، فین^۴ و شارپلس^۵ مجموعه‌ای از معیارها را به منظور شناسایی واکنش‌های ویژه برای تولید مولکول‌های بزرگ از قطعه‌های کوچک و پیوندهای دارای هترواتم تعریف کردند که آن را شیمی کلیک نامیدند [۷]. شیمی کلیک مجموعه‌ای از واکنش‌های قدرتمند، قابل اعتماد و انتخابی برای سنتز سریع ترکیبات مفید جدید می‌باشد [۸]. شارپلس، مجموعه‌ای از معیارهای دقیق را برای شیمی کلیک تعریف کرده که به صورت زیر بیان می‌شود [۷]:

۱. واکنشی که بسیار هدفمند باشد و بازدهی بالایی از محصول تولید کند.
۲. در طی انجام واکنش، محصول‌های جانبی تولید نشود، و اگر محصول جانبی در واکنش حاصل می‌شود، بتوان آن را به وسیله‌ی روش‌های غیرکروماتوگرافی از واکنش حذف کرد.
۳. واکنش فضا ویژه باشد.
۴. شرایط انجام واکنش، کاملاً ساده باشد. به عبارتی شرایط ایده‌آل و مراحل انجام واکنش به اکسیژن و آب حساس نباشد.

^۱-Click Chemistry

^۲-Combinatorial chemistry

^۳-Kolb, H. C

^۴-Finn, M. G

^۵-Sharpless, K. B

۵. مواد اولیه و معرف‌ها در دسترس باشند.

۶. برای انجام واکنش از هیچ حلالی استفاده نشود و اگر وجود حلال الزامی است، از حلال


بی خطر و سبز (آب، اتانول و...) استفاده شود که به آسانی از واکنش حذف گردد.

۷. واکنش برای تولید یک محصول، گزینش پذیر باشد.

واکنش‌های تشکیل پیوند کربن-هترو اتم که به دلیل داشتن شرایط واکنش کلیک مورد مطالعه

قرار گرفتند، شامل مثال‌های معروفی هستند که می‌توان آن‌ها را به صورت زیر معرفی نمود

(طرح ۱-۱) [۹]:




طرح ۱-۱: واکنش‌های شیمی کلیک [۹]

۱-۱-۱) طبقه بندی واکنش‌های کلیک:

۱. واکنش‌های حلقه‌زایی^۱: این واکنش‌ها شامل حلقه‌زایی ۳،۱-دو قطبی و حلقه‌زایی دیلز-

آلدر^۲ است (طرح ۱-۲) [۱۰].




طرح ۱-۲: حلقه‌زایی هویزگن ۳،۱-دو قطبی آزید و آلکین انتهایی

۲. واکنش‌های باز شدن حلقه‌های هتروسیکلی توسط حمله‌ی هسته‌دوست‌ها: از

هتروسیکل‌های تحت فشار الکترون دوست، می‌توان به آزیریدین‌ها، اپوکسیدها،

سولفات‌های حلقوی، یون‌های آزیریدینیوم، یون‌های اپی‌سولفونیوم و غیره اشاره کرد

(طرح ۱-۳) [۱۰].



طرح ۱-۳: باز شدن حلقه‌ی هتروسیکلی توسط حمله‌ی هسته‌دوست

۳. واکنش‌های شیمی کربونیل‌ها از نوع غیر آلدولی^۳: این واکنش‌ها شامل تشکیل اوره‌ها،

تیواوره‌ها، هیدرازون‌ها، اکسیم‌اترها، آمیدها، هتروسیکل‌های آروماتیک و غیره است.

واکنش‌های کربونیل از نوع آلدولی^۴ به دلیل نیروی محرکه ترمودینامیکی کم، زمان

واکنش طولانی و محصولات جانبی فراوان جزء واکنش‌های کلیک نیستند (طرح ۱-۴


و ۱-۵) [۹].

^۱- Cycloadditions


^۲- Diels-Alder cycloadditions

^۳- Non-aldol

^۴- Aldol




طرح ۱-۴: تشکیل هیدرازون / اکسیم اتر




طرح ۱-۵: تشکیل آمید / ایزو اوره

۴. واکنش‌های افزایشی به پیوندهای چندگانه کربن-کربن: این دسته از واکنش‌های افزایشی شامل واکنش‌های اکسایشی نظیر اپوکسیددار شدن^۱، آزیردینه کردن^۲، افزایش سولفونیل هالیدها و نیتروزیل هالیدها بوده، و برخی از افزایش‌های مایکل^۳ را نیز دربر می‌گیرد (طرح ۱-۶ و ۱-۷) [۹، ۱۰].



طرح ۱-۶: تشکیل حلقه‌های سه‌تایی



طرح ۱-۷: واکنش‌های افزایشی پیوندهای چندگانه کربن-کربن

^۱- Epoxidation

^۲- Aziridination

^۳- Michael addition

۱-۱-۲) واکنش حلقه زایی هویزگن:


از میان واکنش‌های مطرح شده، واکنش حلقه‌زایی هویزگن^۱ که منجر به حلقه تری‌آزول می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه به ساختارهای تری‌آزول، نه فقط به علت راحتی سنتز آنها بلکه به علت کاربردهای بیولوژیکی و فارماکولوژیکی آنها است [۱۱]. برای تشکیل حلقه‌ی تری‌آزول، واکنش حلقه‌زایی هویزگن از گستره‌ی بسیار وسیعی از استخلاف‌ها بر روی ترکیبات آزید (۱) و آلکین (۲) استفاده می‌کنند.

این واکنش بیش از ۴۰ سال دارای بازدهی کم، ایجاد مخلوطی از ایزومرهای^۲ ۴،۱- (۳) و ۵،۱- (۱۵)، نیاز به حرارت، زمان طولانی واکنش برای تکمیل شدن و همچنین زمان زیاد برای جداکردن دو ایزومر با روش‌های کروماتوگرافی کلاسیک بوده است [۱۲]. در سال ۲۰۰۲، دو گروه تحقیقاتی شارپلس و ملدال^۳ بطور مستقل با بکار بردن نمک مس(I)، سرعت واکنش را به میزان ۱۰ میلیون بار تسریع نمودند [۱۳]. کاتالیزگر مس(I) در دمای اتاق و یا با کمی حرارت دادن، فقط یکی از دو ایزومر، یعنی ایزومر جهت‌گزین ۴،۱- (۳) را در واکنش مربوطه ایجاد می‌نماید. همچنین کاتالیزگر روتنیوم(II)، منجر به محصول ۵،۱- (۱۵) می‌شود (طرح ۱-۸) [۱۴].

^۱ - Huisgen Cycloaddition

^۲ - Regioisomer

^۳ - Meldal



طرح ۸-۱: واکنش هویزگن در غیاب و حضور کاتالیزگر

۲-۱) شیمی ۳،۲،۱-تری آزولها

۳،۲،۱-تری آزولها جزء مهمترین هتروسیکل‌های پنج عضوی دارای نیتروژن هستند که با توجه به طیف وسیعی از کاربردهای خود در پزشکی [۱۵]، علم مواد [۱۶]، و شیمی آلی ترکیبی [۱۷]، توجه‌های زیادی را به خود جلب نموده‌اند [۱۸]. کاربرد تری آزولها به عنوان عامل‌های دارویی، مواد شیمیایی، کاربردهای صنعتی مانند رنگ، مهار خوردگی، تثبیت کننده‌ی عکس و مواد عکاسی گزارش شده است. علاوه بر این ۳،۲،۱-تری آزولها دارای خواص بیولوژیکی منحصر به فرد از قبیل ضد ویروس، ضد صرع، ضد آلرژی، ضد سرطان، ضد ایدز و فعالیت‌های ضد میکروبی در برابر باکتری‌های گرم مثبت می‌باشند [۱۹].

پایداری ۳،۲،۱-تری آزولها نسبت به اکسایش و کاهش و عدم هیدرولیز در شرایط اسیدی و بازی نشان از پایداری بالای آروماتیسیت این مولکولها دارد، که آنها را به عنوان مهمترین مولکول‌های دارویی مطرح می‌کند [۲۰]. ۳،۲،۱-تری آزولها دارای ممان دوقطبی^۱ بالا

^۱ -dipole moment

می‌باشند [۲۱]، که به مشارکت فعال آنها در تشکیل پیوند هیدروژنی و همچنین دوقطبی - دوقطبی^۱ منتهی می‌شود که موجب بهبود حلالیت آنها شده و باعث سهولت اتصال این مولکول‌ها به اهداف بیولوژیکی می‌شود [۲۲ و ۲۳].


به واسطه‌ی کاربردهای متنوع و مهم تری‌آزول در صنعت و کشاورزی (علف‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها) [۲۴] و همچنین به دلیل موفقیت این ترکیبات در ورود به بازار دارویی، بسیاری از شرکت‌ها و گروه‌های تحقیقاتی علاقه خود را به گسترش شیوه‌های جدید سنتز و غربالگری بیولوژیکی این مواد اختصاص داده‌اند [۲۵]. از جمله کاربردهای تری‌آزول‌ها می‌توان به اورگانوکاتالیزگر [۲۶]، مایعات یونی [۲۷] و گستره وسیعی از فعالیت‌های بیولوژیکی اشاره کرد. بر اساس مقالات به چاپ رسیده در مورد تری‌آزول‌ها به چند مورد از خواص دارویی آنها اشاره می‌شود. ضد باکتری [۲۸، ۲۹]، ضد قارچ [۳۰]، ضد ویروس [۳۱]، β -لاکتاماز [۳۲]، ضد صرع [۳۳]، ضد پلاکت [۳۴]، ضد اسکیزوفرنی^۲ [۳۵]، ضد التهابی [۳۶]، ضد آلرژی [۳۷]، ضد میکروبی [۳۸]، ضد تشنج [۳۹]، تری‌پانوزومی^۳ [۴۰]، ضد آلزایمر [۴۱]، ضد سیکلو اکسیژناز [۴۲]، مهار کننده‌ی تولید NO، (درمان ناتوانی جنسی) [۴۳]، ضد میکروباکتریال (۱۶) [۴۴]، ضد خونکافت^۴ (۱۷) [۴۵]، ضد سرطان خون (۱۸) [۴۶]، ضد ایدز (۱۹) [۴۶]، ضد سم مار [۴۷] و ضد مالاریا (۲۰) [۴۸] (طرح ۱-۹).

^۱ - dipole dipole

^۲ -schizophrenia


^۳ -tripanocidal

^۴ -hemolysis




طرح ۹-۱: نمونه ای از برخی مشتق‌های ۳،۲،۱-تری‌آزول‌های فعال بیولوژیکی

پژوهشگران تاثیر تری‌آزول‌ها در خواص الکتروشیمیایی، نوری و شناسایی کاتیون‌های فلزی به عنوان یک سلول تصویر برداری زنده که توانایی شناسایی و جذب یون Hg^{2+} را داراست مورد بررسی قرار دادند (طرح ۱-۱۰) [۴۹]. از دیگر کاربردهای تری‌آزول‌ها می‌توان به سفید کننده‌های فلوئورسنت، پایدار کننده‌های نوری برای الیاف، پلاستیک، مواد عکاسی [۵۰] و رنگ اشاره کرد [۵۱].



طرح ۱-۱۰: استفاده از تری آزول‌ها به عنوان یک سنسور چند سیگنالی برای شناسایی Hg^{2+} و کاربرد در سلول تصویر برداری زنده [۴۹]

از دیگر کاربردهای تری آزول‌ها می‌توان به تبدیل مشتقات تری آزول به نشر کننده‌ی نور آبی و استفاده در دیودهای نشر کننده آلی^۱ اشاره کرد (طرح ۱-۱۱) [۵۲].



طرح ۱-۱۱: کمپلکس‌های ایریدیوم نشر کننده‌ی نور و نقش تری آزول‌ها در آن [۵۲]

۱-۲-۱) واکنش حلقه زایی آزید-آلکین کاتالیز شده با مس (CuAAC)

بهترین روش برای ساخت ۱،۲،۳-تری آزول‌ها واکنش حلقه زایی آزید-آلکین کاتالیز شده با نمک‌های مس (I)، موسوم به CuAAC^۲ می‌باشد [۵۳ و ۵۴]. نمک‌های مس (I) مورد نیاز

^۱ -OLED_s

^۲ - Copper catalyzed Azid-Alkyne Cycloaddition


واکنش به صورت درجا^۱ به وسیله کاهش نمک مس (II)، اکسایش فلز مس (0)، و یا تسهیم نامتناسب مس (0)/مس (II) تولید می‌شود [۵۵]. نمک مس (I) به دلیل بی ثباتی ترمودینامیکی خود و تشکیل نامطلوب محصولات ناشی از جفت شدن آلکین-آلکین، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد [۵۶].

۱-۲-۱) مکانیسم واکنش حلقه زایی آزید-آلکین کاتالیز شده با مس (CuAAC)

واکنش (CuAAC) به دلیل ساده بودن، قدرت نگهداری گروه‌های عاملی زیاد و بازدهی بالا تمام زمینه‌های شیمی از دانش مواد [۶۰-۵۷]، تا علوم طبیعی [۶۱ و ۶۲] را تحت تاثیر قرار داده است. اولین مکانیسم پیشنهاد شده برای این واکنش مربوط به تشکیل کمپلکس مونو-مس استیلید می‌باشد؛ اگرچه اخیراً کمپلکس بیس-مس استیلید بر اساس تجربه‌های سینتیکی [۶۳]، و تحقیقات محاسباتی [۶۴] ارائه شده است. در سال ۲۰۱۳ فوکین و همکارانش مطالعات بسیار ظریفی را انجام داده و بیان کرده‌اند که کمپلکس مونو-مس استیلید با آزید آلی واکنش نمی‌دهد مگر اینکه یک کاتالیزگر مس اگزوزن^۲ اضافه شود [۶۵]. درمجموع مقایسه کمپلکس های مونو- و بیس-مس استیلید نشان می‌دهد که اگرچه هردو کمپلکس در چرخه کاتالیزگر فعال هستند، کمپلکس بیس از لحاظ سینتیکی بیشتر مورد توجه است (طرح ۱-۱۲).

^۱ - In-situ

^۲ -Exogenous




طرح ۱-۲: مکانیسم واکنش (CuAAC)

۲-۲-۱) سنتز ۳،۲،۱-تری آزولها


توانایی مهندسی و مشاهده‌ی درون سلول‌های زنده تا به حال تاثیر عمیقی بر پژوهش‌های بیولوژیکی گذاشته است که این قابلیت با کمک شیمی کلیک به شکل موثر فراهم شده است [۶۶] در سال ۲۰۱۵ اندرسون^۱ و همکارانش نوعی رادیو دارو را بر اساس شیمی کلیک سنتز کردند که شامل آزید بهینه شده ETAT-Y3 (مدلی از گیرنده سوماتوستاتین به عنوان یک پپتید)، و لیگاند استیلنی چند دندان به پایه‌ی فسفونات با قابلیت متصل شدن به مس رادیواکتیو می‌باشد [۶۷] (طرح ۱-۱۳).

^۱ -Carolyn J. Anderson



طرح ۱-۱۳: تولید رادیو دارو با استفاده از شیمی کلیک

در سال ۲۰۱۵ فیلیپ^۱ و همکارانش برس‌های پلیمری سنتز کردند که به صورت سه بعدی در ابعاد نانو بوسیله شیمی کلیک سنتز شده و دارای زنجیره جانبی طولی بود (طرح ۱-۱۴) [۶۸].




طرح ۱-۱۴: سنتز برس‌های پلیمری با استفاده از شیمی کلیک [۶۸].

استفاده از امواج مایکروویو در واکنش‌های کلیک نخستین بار توسط ون‌درایکن^۲ و کاپه^۳ در سال ۲۰۰۴ مورد بررسی قرار گرفت (طرح ۱-۱۵) [۶۹]. به دلیل موفقیت این روش واکنش‌های حلقه‌زایی ۱،۳-دو قطبی بسیاری با استفاده از این روش گزارش شده است. از مزایای این روش می‌توان به افزایش قابل توجه سرعت و بهبود بازده واکنش اشاره نمود [۷۰].

^۱ -William A. Phillip


^۲ - Van der Eycken

^۳ - Kappe



طرح ۱-۱۵: استفاده از میکروویو در سنتز ۳،۲،۱-تری‌آزول‌ها

اخیراً تحقیقات دیگری در این زمینه که مبتنی بر تولید همزمان^۱ آزید از آنیلین‌ها و در ادامه شرکت دادن آن در واکنش CuAAC است، توسط موسس^۲ و مورهوس^۳ ارائه شده است (طرح ۲۰-۱) [۷۱].



طرح ۱-۱۶: سنتز ۳،۲،۱-تری‌آزول‌ها با استفاده از دی‌آزوسیون آمین‌های آروماتیک به عنوان پیش ماده آزید


استفاده از تابش همزمان امواج میکروویو و فرا صوت برای انجام واکنش CuAAC از فنیل‌استیلین با هپتادسیل‌برمید در حضور کاتالیزگر ناهمگن مس(I) تثبیت شده بروی زغال فعال (Cu(I)/C) را کراوتو^۴ و همکارانش گزارش کردند. اگرچه تابش میکروویو باعث بازده بالا و سرعت بالای واکنش می‌شود (۱۰ دقیقه، ۸۹٪)، ولی استفاده همزمان امواج میکروویو و ماوراء صوت موجب بهبود اندکی در بازده شده است (۱۰ دقیقه، ۹۳٪). واکنش در حالت تک ظرف و تولید همزمان آزید در محیط واکنش نیز با استفاده همزمان از تابش امواج میکروویو و فرا صوت انجام شده است که زمان واکنش از ۲۵ دقیقه به ۲۰ دقیقه کاهش یافته ولی بازده کمتر از ۸۰٪ شده است (در مقایسه با ۸۵٪) (طرح ۱-۱۷) [۷۲].

^۱- *in-situ*

^۲- Moses

^۳- Moorhouse


^۴- Cravotto



طرح ۱-۱۷: کاربرد همزمان تابش امواج میکروویو و تابش فرا صوت برای واکنش CuAAC


واکنش CuAAC اغلب به راحتی در آب به عنوان یک "حلال سبز" انجام می گیرد. عدم انحلال پذیری واکنشگرهای آزید و استیلن گاهی اوقات می تواند مانع جدی برای استفاده از این محیط واکنش شود. به همین دلیل اخیراً جهت سنتز مواد آلی، مایعات یونی (ILs) به عنوان حلال های سازگار با محیط زیست مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند [۷۳]. مایعات یونی نمک های مذاب با نقطه ذوب پایین بوده و معمولاً از کاتیون های آلی و آنیون های غیرآلی تشکیل شده اند. این ترکیبات، پایداری شیمیایی و حرارتی بالا و همچنین فشار بخار کم دارند که این ویژگی ها موجب گردیده تا این ترکیبات حلال خوبی برای طیف وسیعی از مواد آلی و غیرآلی باشند. بازیافت و استفاده مجدد از آنها از دیگر مزایای این خانواده از ترکیبات است [۷۳]. واکنش تک ظرف آزیدار کردن - CuAAC شامل واکنش فروسنیل استیلن (۴۶) و بنزیل برمید (۳۸) در مخلوطی از مایع یونی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم تترافلوئوربورات ($[\text{bmim}]\text{BF}_4$) و آب (۱:۱) توسط لیانگ^۱ و همکارانش گزارش گردیده است (طرح ۱-۱۸).

^۱- Liang




طرح ۱-۱۸: واکنش CuAAC با استفاده از مایع یونی و آب به عنوان حلال

در سال ۲۰۰۸، دوندونی^۱ و همکارانش مایعات یونی را به عنوان حلال در واکنش CuAAC اتینیل C-گالاکتوزید (۴۸) و متیل-۶-آزیدوگلوکوپیرانوزید (۴۹) گزارش نمودند (طرح ۱-۱۹) [۷۳].



طرح ۱-۱۹: واکنش CuAAC با استفاده از مایع یونی به عنوان حلال

یکی از واکنش‌های کلیک-چندجزئی که اخیراً گزارش شده شامل ۲-آزیدوالکل‌های به وجود آمده از واکنش اپوکسیدها با سدیم آزید در واکنش با آلکین‌های انتهایی است که منجر به ایجاد ترکیبات شیمیایی جدیدی از β-هیدروکسی‌تری‌آزول‌ها شده است (طرح ۱-۲۰) [۷۴].



طرح ۱-۲۰: سنتز β-هیدروکسی‌تری‌آزول‌ها از واکنش بین اپوکسیدها، سدیم آزید و آلکین‌ها

^۱- Dondoni

فصل دوم

بحث و بررسی نتایج

۲) بحث و بررسی نتایج


۳،۲،۱-تری آزول‌ها نماینده یک دسته مهم از ترکیبات هتروسیکل پنج عضوی هستند که فعالیت‌های بیولوژیکی متنوع دارند. با توجه به موفقیت تری آزول‌ها در ورود به بازارهای دارویی و استفاده در پزشکی، بسیاری از شرکت‌ها و گروه‌های تحقیقاتی نسبت به توسعه روش‌های سنتز و ارزیابی بیولوژیکی این ترکیبات، علاقه نشان داده اند [۷۵].

از طرفی انواع مختلف ۴،۲،۱-تری آزین‌های کشف شده دارای کاربردهایی از قبیل مصارف دارویی، علف‌کش، آفت‌کش و رنگ [۷۶] می‌باشند، به عنوان مثال آزانوکلئوزیدهای ۶-آزا سیتوزین^۱ و ۶-آزا یوراسیل^۲ که دارای ساختار پایه ۴،۲،۱-تری آزین در هسته خود می‌باشند، فعالیت‌های بیولوژیکی موثری از جمله ضد تومور [۷۷]، ضد ویروس [۷۸]، ضد قارچ [۷۹]، ضد ایدز [۸۰]، و فعالیت‌های ضد میکروبی [۸۱] دارند.


با توجه به مطالب گفته شده و اهمیت این دو سیستم هتروسیکلی برآن شدیم تا ترکیبات جدید حاصل از اتصال این دو سیستم هتروسیکلی را با استفاده از شیمی کلیک و واکنش CuAAC سنتز نماییم. در این پروژه ترکیبات جدیدی از ۳،۲،۱-تری آزول‌های متصل شده به حلقه ۴،۲،۱-تری آزین و ۴،۲،۱-بنزوتری آزین با استفاده از ۶-متیل-۳-(پروپ-۲-اینیل تیو)-۴،۲،۱-تری آزین-۵-(۴H)-اون (۵۴) و ۳-(پروپ-۲-اینیل تیو)-۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۷) و آزیدهای آروماتیک در حضور کاتالیزگر مس(II) استات و سدیم اسکورات با بهره بالا سنتز شدند (طرح ۱-۲).

^۱ -6-azacytosine

^۲ -6-azauracil



در بخش دیگری از این پژوهش سنتز سه جزئی تک ظرفی ۱، ۲، ۳-تری آزول‌های جدید از واکنش ترکیبات استیلنی مربوطه با سدیم آزید و هالیدهای آلیفاتیک مختلف در حضور کاتالیزگر مس(II) استات و سدیم اسکورات در حلال‌های اتانول مغناطیسی، $\text{DMF}/\text{H}_2\text{O}$ و دمای 50°C با بهره‌ای بالا انجام گردید (طرح ۲-۲).




19



۴- ایل (متیل تیو) - ۱، ۲، ۴- تری آزین - ۵ (۴H) - ۱- اون

برای بهینه کردن شرایط واکنش، از واکنش ترکیب ۶-متیل-۳-(پروپ-۲-ینیل تیو)-۱،۲،۴-تری آزین-۵-(۴H)-اون (۵۵) با ۱-آزیدو-۳-نیتروبنزن (۵۴c) در حضور کاتالیزگر نمک‌های مس(II) و سدیم‌اسکوربات به‌عنوان واکنش مبنا استفاده شد (طرح ۲-۶). در این واکنش اثرات نوع و میزان کاتالیزگر، دما، باز و حلال بر روی بهره‌ی واکنش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده در جدول (۲-۱) گزارش شده است.



جدول ۱-۲: بهینه کردن نوع کاتالیزگر، دما و حلال در واکنش (طرح ۲-۶)

بهره (%)	زمان (h)	دما (°C)	حلال	مقدار کاتالیزگر (mol%)	کاتالیزگر	ردیف
۵۰	۱۲	r.t	EtOH	۵	Cu(OAc) ₂	۱
۶۰	۸	r.t	EtOH	۱۰	Cu(OAc) ₂	۲
۹۶	۱	r.t	DMF	۱۰	Cu(OAc) ₂	۳

ادامه‌ی جدول ۲-۱: بهینه کردن نوع کاتالیزگر، دما و حلال در واکنش (طرح ۲-۶)

بهره (%)	زمان (h)	دما (°C)	حلال	مقدار کاتالیزگر (mol%)	کاتالیزگر	ردیف
۳۵	۲۴	r.t	CH ₃ CN	۱۰	Cu(OAc) ₂	۴
---	۲۴	r.t	Neat	۱۰	Cu(OAc) ₂	۵
۷۴	۹	r.t	DMF / H ₂ O	۱۰	Cu(OAc) ₂	۶
---	۲۴	r.t	THF	۱۰	Cu(OAc) ₂	۷
۳۸	۱۲	r.t	H ₂ O	۱۰	Cu(OAc) ₂	۸
۴۸	۱۰	۱۰۰	H ₂ O	۱۰	Cu(OAc) ₂	۹
۸۰	۸	r.t	DMF	۱۰	CuSO ₄	۱۰
۸۵	۱۰	۱۰۰	DMF	۱۰	CuSO ₄	۱۱
۷۰	۴۸	۶۰	DMF	۱۰	CuCl ₂	۱۲
۸۰	۲۴	r.t	DMF	۱۰	CuI	۱۳
۸۵	۴	r.t	Mag. EtOH	۱۰	Cu(OAc) ₂	۱۴

با توجه به جدول (۲-۱)، شرایط بهینه برای سنتز ترکیب ۳،۲،۱-تری‌آزول متصل به حلقه ۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۵c)، مقدار ۱۰ mol% از کاتالیزگر مس(II) استات و ۲۰ mol% سدیم اسکوربات به عنوان کاهنده و باز، در حلال DMF و دمای اتاق می‌باشد. در این واکنش سدیم آسکوربات به عنوان کاهنده عمل کرده و مس(II) را به مس(I) کاهش می‌دهد. در ادامه با استفاده از شرایط بهینه مشتقات جدیدی از ۶-متیل-۳-((۱-آریل-۱H-۳،۲،۱-تری‌آزول-۴-ایل)-(متیل تیو)-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵(۴H)-ون (۵۵)، سنتز گردید. نتایج این سنتزها در جدول (۲-۲) جمع‌آوری شده است.


جدول ۲-۲: نقطه ذوب، زمان و بهره‌ی واکنش سنتز مشتقات جدید ترکیب (۵۵)

ترکیب	ساختر	بهره واکنش (%)	زمان (h)	نقطه ذوب (°C)
۵۵a		۸۵	۰/۵	۲۲۱-۲۲۳
۵۵b		۹۰	۳	۲۱۴-۲۱۶
۵۵c		۹۶	۱	۲۱۵-۲۱۶
۵۵d		۸۵	۴	۲۵۲-۲۵۳
۵۵e		۹۰	۰/۵	۲۲۶-۲۲۷
۵۵f		۸۵	۱	۲۴۴-۲۴۶
۵۵g		۹۰	۵	۲۳۷

۲-۲) سنتز مشتقات جدید ۳- $\{(1\text{-}H\text{-}3,2,1\text{-}4\text{-}triazol\text{-}4\text{-}yl)\}$


متیل تیو-۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین

برای سنتز مشتقات ۳- $\{(1\text{-}H\text{-}3,2,1\text{-}4\text{-}triazol\text{-}4\text{-}yl)\}$ -متیل تیو-۴،۱-دی‌هیدروبنزو [e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۷)، ابتدا ترکیب ۲،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۶۸) با استفاده از تیوسمی کاربازید (۶۲) و ۲،۱-فنیلن دی‌آمین (۶۷)، با نسبت مولی برابر در شرایط بدون حلال و دمای 220°C ، سنتز شد در اثر واکنش این ترکیب با پروپارژیل برمید در حضور باز سدیم متوکسید در حلال متانول، ترکیب ۳-(پروپ-۲-اینیل تیو)-۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۶) سنتز شد [۸۳] (طرح ۷-۲).



طرح ۷-۲: سنتز ترکیب ۳-(پروپ-۲-اینیل تیو)-۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین

از واکنش ۳-(پروپ-۲-اینیل تیو)-۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۶) با آزیدهای آروماتیک (۵۴) در حضور کاتالیزگر مس(II) استات و سدیم اسکوربات در حلال DMF و دمای اتاق مشتقات ۳- $\{(1\text{-}H\text{-}3,2,1\text{-}4\text{-}triazol\text{-}4\text{-}yl)\}$ -متیل تیو-۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۷) سنتز شد (طرح ۸-۲).




طرح ۸-۲: سنتز مشتقات جدید ۳-تری‌آزول‌های متصل به حلقه ی ۴،۲،۱-بنزوتری‌آزین

۲-۲-۱) بهینه کردن سنتز مشتقات ۳- (۱-آریل-۱H-۳،۲،۱-تری آزل-۴-ایل)

متیل تیو-۴،۱-دی هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین

برای بهینه کردن شرایط واکنش، از واکنش ترکیب ۳- (پروپ-۲-اینیل تیو)-۴،۱-دی هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۶) با ۱-آزیدو-۳-نیتروبنزن (۵۴c) در حضور کاتالیزگرهای نمک مس (II) و سدیم اسکوربات به عنوان واکنش مبنا استفاده شد (طرح ۲-۹). در این واکنش اثرات میزان کاتالیزگر، دما، باز و حلال بر روی بهره‌ی واکنش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در جدول (۳-۲) گزارش شده است.



طرح ۲-۹: واکنش ۳- (پروپ-۲-اینیل تیو)-۴،۱-دی هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۶) با ۱-آزیدو-۳-نیتروبنزن (۵۴c) در حضور کاتالیزگر و حلال در دماهای متفاوت

جدول ۳-۲: بهینه کردن نوع و مقدار کاتالیزگر، دما، و حلال در واکنش (طرح ۲-۹)








بهره (%)	زمان (h)	دما (°C)	حلال	مقدار کاتالیزگر (mol%)	کاتالیزگر	ردیف
۶۰	۲۴	r.t	EtOH	۵	Cu(OAc) ₂	۱
۷۰	۱۲	r.t	DMF	۵	Cu(OAc) ₂	۲
۹۰	۴	r.t	EtOH	۱۰	Cu(OAc) ₂	۳
۹۵	۱	r.t	DMF	۱۰	Cu(OAc) ₂	۴
---	۲۴	r.t	THF	۱۰	Cu(OAc) ₂	۵
۸۰	۹	r.t	DMF/ H ₂ O	۱۰	Cu(OAc) ₂	۶
---	۱۰	۱۰۰	THF	۱۰	Cu(OAc) ₂	۷

ادامه‌ی جدول ۳-۲: بهینه کردن نوع و مقدار کاتالیزگر، دما، و حلال در واکنش (طرح ۲-۹)

ردیف	کاتالیزگر	مقدار کاتالیزگر (mol%)	حلال	دما (°C)	زمان (h)	بهره (%)
۸	Cu(OAc) ₂	۱۰	H ₂ O	r.t	۶	۵۰
۹	Cu(OAc) ₂	۱۰	H ₂ O	۱۰۰	۴	۶۵
۱۰	CuSO ₄	۱۰	DMF	r.t	۱۲	۷۰
۱۱	CuSO ₄	۱۰	EtOH	r.t	۱۲	۵۰
۱۲	CuCl ₂	۱۰	DMF	۶۰	۲۴	۸۰
۱۳	Cu(OAc) ₂	۱۰	EtOH/H ₂ O	r.t	۸	۵۵
۱۴	Cu(OAc) ₂	۵	Mag. EtOH	r.t	۴	۸۰
۱۵	Cu(OAc) ₂	۱۰	Mag. EtOH	r.t	۳	۹۰

با توجه به جدول (۳-۲)، شرایط بهینه برای سنتز ترکیب ۳،۲،۱-تری‌آزول متصل به حلقه ۴،۲،۱-بنزوتتری‌آزین (۵۷c)، مقدار ۱۰ mol% از کاتالیزور مس(II) استات و ۲۰ mol% سدیم اسکوربات به عنوان کاهنده و باز، در حلال DMF و دمای اتاق می‌باشد. در ادامه با استفاده از شرایط بهینه مشتقات جدیدی از ۳- $\{(1\text{-آریل-}H-1,2,3\text{-تری‌آزول-}4\text{-یل})\text{-متیل تیو}\}$ -۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۷)، سنتز و نتایج در جدول (۴-۲) جمع‌آوری شده است.


جدول ۴-۲: نقطه ذوب، زمان و بهره واکنش سنتز مشتقات جدید ترکیب (۵۷)

ترکیب	ساختار	بهره واکنش (%)	زمان (h)	نقطه ذوب (°C)
۵۷a		۸۰	۲	۱۵۲
۵۷b		۸۵	۴	۱۶۰
۵۷c		۹۵	۱	۹۶-۹۸
۵۷d		۸۵	۲	۱۴۱-۱۴۴
۵۷e		۹۰	۱	۱۵۰-۱۵۲
۵۷f		۹۰	۲	۱۸۰-۱۸۱
۵۷g		۸۵	۳	۲۵۰-۲۵۲

۳-۲) سنتز سه جزئی مشتقات ۶-متیل-۳- $\{(1\text{-آریل-}H-1,2,1\text{-تری}$

آزول-۴-ایل)-متیل تیو}-۴,۲,۱-تری آزین-۵-(۴H)-اون

با استفاده از واکنش چند جزئی تک ظرفی، مشتقات ۶-متیل-۳- $\{(1\text{-آریل-}H-1,2,1\text{-تری}$ تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو}-۴,۲,۱-تری آزین-۵-(۴H)-اون (۶۰) از واکنش ۶-متیل-۳-(پروپ-۲-اینیل تیو)-۴,۲,۱-تری آزین-۵-(۴H)-اون (۵۳) با سدیم آزید (۵۸) و ۴-نیتروبنزیل کلراید (۵۹c) در حضور کاتالیزگر مس(II) استات و سدیم اسکوربات در حلال DMF/H₂O و دمای ۵۰°C سنتز شد. شرایط بهینه واکنش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در جدول (۵-۲) جمع آوری شده است.



طرح ۲-۱۰: واکنش ۶-متیل-۳-(پروپ-۲-اینیل تیو)-۴,۲,۱-تری آزین-۵-(۴H)-اون (۵۳) با سدیم آزید (۵۸) و ۲-کلروبنزیل کلراید (۵۹c) در حضور کاتالیزگر و حلال در دماهای متفاوت

جدول ۵-۲: بهینه کردن نوع کاتالیزگر، دما، و حلال در واکنش (طرح ۲-۱۰)

بهره (%)	زمان (h)	دما (°C)	حلال	مقدار کاتالیزگر (mol%)	کاتالیزگر	ردیف
۲۲	۲۰	rt	EtOH	۱۰	Cu(OAc) ₂	۱
۱۸	۲۴	rt	H ₂ O	۱۰	Cu(OAc) ₂	۲
۴۰	۲۴	۸۰	H ₂ O	۱۰	Cu(OAc) ₂	۳
۴۳	۱۲	rt	DMF	۱۰	Cu(OAc) ₂	۵
۶۸	۱۲	۸۰	DMF	۱۰	Cu(OAc) ₂	۶

ادامه‌ی جدول ۲-۵: بهینه کردن نوع کاتالیزگر، دما، و حلال در واکنش (طرح ۲-۱۰)

بهره (%)	زمان (h)	دما (°C)	حلال	مقدار کاتالیزگر (mol%)	کاتالیزگر	ردیف
۸۵	۳	۵۰	DMF/ H ₂ O	۱۰	Cu(OAc) ₂	۷
۸۰	۱۲	۸۰	DMSO	۱۰	Cu(OAc) ₂	۸
۷۰	۶	۵۰	Mag. EtOH	۱۰	Cu(OAc) ₂	۹
۷۵	۱۲	۸۰	Mag. EtOH	۱۰	Cu(OAc) ₂	۱۰

با توجه به جدول (۲-۵)، شرایط بهینه برای سنتز ترکیب ۳،۲،۱-تری‌آزول (۶۰c)، مقدار ۱۰ mol% از کاتالیزگر مس(II) استات و ۲۰ mol% سدیم اسکوربات به عنوان کاهنده و باز، در حلال DMF/H₂O و دمای ۵۰°C می‌باشد. در ادامه با استفاده از شرایط بهینه مشتقات جدیدی از مشتقات ۶-متیل-۳- $\{(1\text{-آریل-}H\text{-}1,2,3\text{-تری‌آزول-}4\text{-یل})\}$ -متیل تیو-۱-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵(۴H)-ون (۶۰) به صورت سه جزئی سنتز گردید. نتایج در جدول (۲-۶) جمع‌آوری شدند.


جدول ۲-۶: نقطه ذوب، زمان و بهره واکنش سنتز مشتقات جدیدی از ترکیب (۵۸)

ترکیب	ساختار	بهره واکنش (%)	زمان (h)	نقطه ذوب (°C)
۶۰a		۷۵	۶	۱۸۹-۱۹۰
۶۰b		۸۰	۲	۲۰۳-۲۰۵
۶۰c		۸۵	۳	۱۶۵

۴-۲) سنتز سه جزئی مشتقات ۳-((۱-آریل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-

ایل)-متیل تیو}-۴،۱-دی هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین

با استفاده از واکنش سه جزئی تک ظرفی، مشتقات ۳-((۱-آریل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴- ایل)-متیل تیو}-۴،۱-دی هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۶۱) از واکنش ۳-(پروپ-۲-اینیل تیو) ۴،۱-دی هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۶) با سدیم آزید (۵۸) و هالیدهای آلیفاتیک (۵۹) در حضور کاتالیزگر مس(II) استات و سدیم اسکوربات در حلال اتانول مغناطیسی و دمای ۵۰°C سنتز شد. شرایط بهینه واکنش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در جدول (۷-۲) جمع آوری شده است.



طرح ۱۱-۲: واکنش ۳-(پروپ-۲-اینیل تیو) ۴،۱-دی هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۶) با سدیم آزید (۵۸) و هالیدهای آلیفاتیک (۵۹) در حضور کاتالیز و حلال در دماهای متفاوت

جدول ۷-۲: بهینه کردن نوع کاتالیزگر، دما و حلال در واکنش (طرح ۱۱-۲)

ردیف	کاتالیزگر	مقدار کاتالیزگر (mol%)	حلال	دما (°C)	زمان (h)	بهره (%)
۱	Cu(OAc) ₂	۵	EtOH	۶۰	۲۴	۵۰
۲	Cu(OAc) ₂	۱۰	EtOH	۶۰	۱۲	۷۰
۳	Cu(OAc) ₂	۱۰	EtOH	۸۰	۱۲	۶۵
۴	Cu(OAc) ₂	۱۰	DMSO	۶۰	۱۲	۷۵
۵	Cu(OAc) ₂	۱۰	DMSO	۸۰	۱۲	۸۰
۶	Cu(OAc) ₂	۱۰	DMSO	۱۰۰	۱۲	۸۰

ادامه‌ی جدول ۷-۲: بهینه کردن نوع کاتالیزگر، دما و حلال در واکنش (طرح ۱۱-۲)

بهره (%)	زمان (h)	دما (°C)	حلال	مقدار کاتالیزگر (mol%)	کاتالیزگر	ردیف
۶۰	۱۴	۸۰	DMF	۱۰	Cu(OAc) ₂	۷
۶۵	۸	r.t	DMF/H ₂ O	۱۰	Cu(OAc) ₂	۸
۸۵	۴	۵۰	DMF/H ₂ O	۱۰	Cu(OAc) ₂	۹
۸۵	۶	۸۰	DMF/H ₂ O	۱۰	Cu(OAc) ₂	۱۰
۹۰	۲	۵۰	Mag. EtOH	۱۰	Cu(OAc) ₂	۱۱
۹۰	۲	۸۰	Mag. EtOH	۱۰	Cu(OAc) ₂	۱۲
۵۰	۱۲	۶۰	Mag. EtOH	۱۰	CuSO ₄	۱۳
۷۰	۲۴	۸۰	Mag. EtOH	۱۰	CuCl ₂	۱۴

با توجه به جدول (۷-۲)، شرایط بهینه برای سنتز ترکیب ۳،۲،۱-تری‌آزول (۶۱b)، مقدار ۱۰ mol% از کاتالیزگر مس(II) استات و ۲۰ mol% سدیم اسکورات به عنوان کاهنده و باز، در حلال اتانول مغناطیسی و دمای ۵۰°C می‌باشد. اتانول مغناطیسی با استفاده از دستگاه مغناطیسی کردن حلال‌ها به مدت ۱۵ دقیقه چرخش اتانول در دستگاه به‌دست آمده است. در ادامه با استفاده از شرایط بهینه مشتقات جدیدی از مشتق‌های ۳- $\{(1\text{-}H\text{-}1\text{-}آریل\text{-}۳،۲،۱\text{-}تری‌آزول\text{-}۴\text{-}ایل)\text{-}متیل\text{-}تیو\}$ ۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۶۱) به صورت سه جزئی سنتز گردید. نتایج در جدول (۹-۲) جمع‌آوری شده است.

به منظور بهینه کردن شرایط واکنش در اتانول مغناطیسی، واکنش‌هایی در حلال اتانول، اتانول مغناطیسی شده در زمان‌های ۲، ۵ و ۱۵ دقیقه چرخش اتانول در دستگاه مغناطیسی انجام و نتایج در جدول (۸-۲) جمع‌آوری گردید.

جدول ۲-۸: بهینه کردن شرایط واکنش در اتانول مغناطیسی

حلال	اتانول	اتانول مغناطیسی ۲ دقیقه	اتانول مغناطیسی ۵ دقیقه	اتانول مغناطیسی ۱۵ دقیقه
زمان تکمیل واکنش (دقیقه)	۱۲	۴	۲	۲

با توجه به جدول حداکثر میزان مغناطیسی شدن اتانول در دستگاه مغناطیسی ۵ دقیقه می باشد.

جدول ۲-۹: نقطه ذوب، زمان و بهره واکنش سنتز مشتقات جدید ترکیب (۶۱)

ترکیب	ساختار	بهره واکنش (%)	زمان (h)	نقطه ذوب (°C)
۶۱a		۸۰	۱۲	۱۶۰-۱۶۲
۶۱b		۹۰	۲	۱۷۷-۱۷۸
۶۱c		۹۰	۴	۸۱-۸۳
۶۱d		۷۵	۴	روغنی
۶۱e		۸۵	۴	۱۷۰

۵-۲) شواهد طیفی مشتقات ۶-متیل-۳- $\{(1H-1-آریل-۳,۲,۱-تری آزول-۳-۲\}$

۴-۱(یل)-متیل تیو- $\{۴,۲,۱-تری آزین-۵(H۴)-اون$

۲-۵-۱) ۶-متیل-۳- $\{(1-فنیل-۳,۲,۱-تری آزول-۴-یل)-متیل تیو\}$ - $۴,۲,۱-$

تری آزین-۵(H۴)-اون (۵۵a)

در طیف 1H NMR این ترکیب که در حلال DMSO دوتره گرفته شده است (طیف ۴-۱ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل به صورت یک قله‌ی یکتایی در جابجایی شیمیایی ۲/۱ ppm با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۵ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های حلقه‌ی آروماتیک به صورت یک قله‌ی چندتایی در ۷/۸-۸/۰ ppm با سطح زیر پیک پنج هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۸/۷ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب که به صورت قرص KBr گرفته شده است (طیف ۴-۲ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۴۰۰ و 1600 cm^{-1} و جذب کششی پیوند (C-H) آروماتیک و آلیفاتیک به ترتیب در ۳۱۲۴ و 2923 cm^{-1} ظاهر شده است. ارتعاش کششی پیوند (NH) در ۳۴۵۰ و ارتعاش کششی پیوند کربونیل آمیدی در 1617 cm^{-1} قابل مشاهده می‌باشد.

۲-۵-۲) ۶-متیل-۳- $\{(2-نیترو فنیل)-۱H-۳,۲,۱-تری آزول-۴-یل)-$

متیل تیو- $\{۴,۲,۱-تری آزین-۵(H۴)-اون$ (۵۵b)

در طیف 1H NMR این ترکیب (طیف ۴-۳ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۲/۱ ppm با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۶ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های حلقه آروماتیک به

صورت چندتایی در ۷/۷-۸/۴ ppm با سطح زیر پیک چهار هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۸/۶ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۴ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۴۵۰ و ۱۶۰۰ cm^{-1} و جذب کششی (NH) در ۳۴۵۰ cm^{-1} ظاهر شده است. در ۱۶۳۰ cm^{-1} ارتعاش مربوط به گروه کربونیل آمیدی و همچنین در ناحیه ۱۳۶۰ و ۱۵۴۰ cm^{-1} ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن مربوط به گروه نیترو ظاهر شده است.

۲-۵-۳ (۳-۵-۲) ۶-متیل-۳- $\{ (۱)-(۳)\}$ -نیتروفنیل-۱H-۳،۲،۱-تری‌آزول-۴-ایل-)

متیل تیو-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵-(۴H)-اون (۵۵c)

در طیف $^1\text{H-NMR}$ این ترکیب (طیف ۵-۴ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۲/۱ ppm با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلین به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۵ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون پارا نسبت به گروه نیترو حلقه آروماتیک به صورت چندتایی در ۷/۹-۸/۰ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن، پروتون‌های اورتو و متا نسبت به گروه نیترو در حلقه آروماتیک به صورت چندتایی در ۸/۲-۸/۵ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون اورتو نسبت به گروه نیترو و حلقه آروماتیک به صورت چندتایی در ۸/۶-۸/۸ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۸/۹ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۶ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۴۸۰ و ۱۶۰۰ cm^{-1} و جذب کششی پیوند (NH) در ۳۴۵۰ cm^{-1} ظاهر شده است. در ۱۶۴۰ cm^{-1} ارتعاش مربوط به گروه کربونیل آمیدی و همچنین در ناحیه ۱۳۴۵ و ۱۵۲۰ cm^{-1} ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن مربوط به گروه نیترو ظاهر شده است.

۲-۵-۴) ۶-متیل-۳-((۱-۴-نیتروفنیل)-۱H-۲،۱-۳-تری آزول-۴-ایل)-
 متیل تیو{-۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-اون (۵۵d)

در طیف $^1\text{H-NMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۷ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل به صورت یک قله ی یکتایی در ۲/۱ ppm با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن به صورت یک قله ی یکتایی در ۴/۶ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های حلقه آروماتیک به صورت چندتایی در ۸/۵-۸/۰ ppm با سطح زیر پیک چهار هیدروژن و پروتون C-H حلقه ی تری آزول به صورت یک قله ی یکتایی در ۸/۹ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۸ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۴۶۰ و ۱۶۰۰ cm^{-1} و جذب کششی پیوند (NH) در ۳۵۰۰ cm^{-1} ظاهر شده است. در ۱۶۳۰ cm^{-1} ارتعاش مربوط به گروه کربونیل آمیدی و همچنین در ناحیه ۱۳۴۰ و ۱۵۲۰ cm^{-1} ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن مربوط به گروه نیترو ظاهر شده است.

۲-۵-۵) ۶-متیل-۳-((۱-۳-کلروفنیل)-۱H-۲،۱-۳-تری آزول-۴-ایل)-
 متیل تیو{-۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-اون (۵۵e)

در طیف $^1\text{H-NMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۹ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل به صورت یک قله ی یکتایی در جابجایی شیمیایی ۲/۱ ppm با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن

به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۵ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های حلقه آروماتیک به صورت چندتایی در ۷/۴-۸/۰ ppm با سطح زیر پیک چهار هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۸/۸ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۱۰ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۴۸۰ و ۱۵۹۰ cm^{-1} و جذب کششی پیوند (NH) در ۳۴۸۰ cm^{-1} ظاهر شده است. در ۱۶۴۰ cm^{-1} ارتعاش مربوط به گروه کربونیل آمیدی ظاهر شده است.

۲-۵-۶ متیل-۳- $\{ (۱)-(۴)\text{-نیترو-۳-کلوپنیل}-(۱H-۲,۱,۳\text{-تری آزول-۴-ایل})\}$ -

متیل تیو- $\{ ۴,۲,۱\text{-تری آزین-۵-(۴H)-اون} (۵۵f) \}$

در طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۱۱ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۲/۱ ppm با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلین به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۶ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون پارا نسبت به گروه نیترو در حلقه آروماتیک به صورت دابلت در ۷/۹-۸/۱ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن، پروتون متا نسبت به گروه نیترو در حلقه آروماتیک به صورت دابلت-دابلت در ۸/۲-۸/۴ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن، پروتون اورتو نسبت به گروه نیترو در حلقه آروماتیک به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۸/۷ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۸/۸ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۱۲ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۴۸۰ و ۱۶۰۰ cm^{-1} و جذب کششی پیوند (NH) در ۳۴۰۰ cm^{-1} ظاهر شده است. در ۱۶۴۰ cm^{-1} ارتعاش مربوط به گروه کربونیل آمیدی و همچنین در ناحیه ۱۳۶۰ و ۱۵۴۰ cm^{-1} ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن مربوط به گروه نیترو ظاهر شده است.

۲-۵-۷) ۴-۴-۶-متیل-۵-اکسو-۵،۴-دی‌هیدرو-۴،۲،۱-تری‌آزین-۳-ایل تیو)-

متیل-۱H-۳،۲،۱-تری‌آزول-۱-ایل)-بنزوئیک اسید (۵۵g)

در طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۱۳ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۲/۱ ppm با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۶ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های حلقه آروماتیک را به صورت چندتایی در ۷/۹-۸/۲ ppm با سطح زیر پیک چهار هیدروژن، قله مربوط به اسید کربوکسیلیک با پیک آب تداخل پیدا کرده و پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۸/۸ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۱۴ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (NH) در 3410 cm^{-1} ظاهر شده است. ارتعاش کششی مربوط به پیوند OH اسیدی در 2400 تا 3500 cm^{-1} مشاهده می‌شود، ارتعاش مربوط به پیوند (C=O) کششی آمیدی در 1616 cm^{-1} ظاهر شده، همچنین در ارتعاش مربوط به پیوند (C=O) اسیدی در 1700 cm^{-1} ظاهر شده است.

۲-۵-۸) ۶-متیل-۳-((۲-اکسو‌پروپیل)-۱H-۳،۲،۱-تری‌آزول-۴-ایل)-

متیل تیو)-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵(۴H)-اون (۶۰a)

در طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۱۵ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۲/۱ ppm با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیل متصل به گروه کربونیل به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۲/۲ ppm با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن متصل به گوگرد به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۵ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن متصل به نیتروژن حلقه تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۵/۴ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۷/۹ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۱۶ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (NH) در 3500 cm^{-1} ، همچنین ارتعاش مربوط به پیوند (C=O) آمیدی نیز در ناحیه 1650 cm^{-1} مشاهده می‌شود، ارتعاش گروه کربونیل متصل به حلقه تری‌آزول در 1731 cm^{-1} ظاهر شده است.

۲-۵-۹) ۶-متیل-۳-((۱-۴-متیل بنزیل)-۱H-۳،۲،۱-تری‌آزول-۴-ایل)-

متیل تیو)-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵-(۴H)-اون (۶۰b)

در طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۱۷ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل به صورت یک قله‌ی یکتایی در $2/1\text{ ppm}$ با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیل متصل به حلقه آروماتیک به صورت یک قله‌ی یکتایی در $2/3\text{ ppm}$ با سطح زیر پیک سه هیدروژن مشاهده می‌شود. پروتون‌های گروه متیلن متصل به گوگرد به صورت یک قله‌ی یکتایی در $4/6\text{ ppm}$ با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن متصل به نیتروژن حلقه تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در $5/5\text{ ppm}$ با سطح زیر پیک دو هیدروژن مشاهده می‌شود. همچنین پروتون‌های حلقه آروماتیک را به صورت چندتایی در $7/1-7/2\text{ ppm}$ با سطح زیر پیک چهار هیدروژن و پروتون CH حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در $8/0\text{ ppm}$ با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۱۸ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (NH) در 3455 cm^{-1} ، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده 1459 و 1590 cm^{-1} ، همچنین ارتعاش مربوط به پیوند (C=O) آمیدی نیز در ناحیه 1619 cm^{-1} مشاهده می‌شود.

۲-۵-۱۰) ۶-متیل-۳-((۱-۴-نیترو بنزیل)-۱H-۳،۲،۱-تری‌آزول-۴-ایل)-

متیل تیو)-۴،۲،۱-تری‌آزین-۵-(۴H)-اون (۶۰c)

در طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۱۹ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل به صورت یک

قله‌ی یکتایی در ppm ۲/۱ با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن متصل به گوگرد به صورت یک قله‌ی یکتایی در ppm ۴/۴ با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن متصل به نیتروژن حلقه تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ppm ۵/۸ با سطح زیر پیک دو هیدروژن مشاهده می‌شود. همچنین پروتون‌های موقعیت متا نسبت به گروه نیترو در حلقه آروماتیک به صورت دابلت در ppm ۷/۴-۷/۶ با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های موقعیت اورتو نسبت به گروه نیترو در حلقه آروماتیک را به صورت دابلت در ppm ۸/۲-۸/۳ با سطح زیر پیک دو هیدروژن و پروتون گروه C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ppm ۸/۱ با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۲۰ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (NH) در 3450 cm^{-1} ، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده 1458 cm^{-1} و 1595 cm^{-1} ، ارتعاش مربوط به پیوند (C=O) آمیدی در ناحیه 1620 cm^{-1} مشاهده می‌شود، همچنین در ناحیه 1342 cm^{-1} و 1520 cm^{-1} ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن مربوط به گروه نیترو ظاهر شده است.

۲-۶) شواهد طیفی مشتقات ۳- $\{(1\text{-آریل-}H-1,2,3\text{-تری‌آزول-}4\text{-ایل})\}$

متیل تیو-۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۷)

۲-۶-۱) ۳- $\{(1\text{-فنیل-}H-1,2,3\text{-تری‌آزول-}4\text{-ایل})\}$ -متیل تیو-۴،۱-دی‌هیدروبنزو

[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۷a)

در طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۲۱ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیلن به صورت یک قله‌ی یکتایی در ppm ۴/۷ با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های حلقه آروماتیک متصل به تری‌آزین، حلقه آروماتیک متصل به حلقه تری‌آزول و NH تری‌آزین به صورت چندتایی در

۷/۰-۸/۰ ppm با سطح زیر پیک بازده هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۸/۷ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۲۲ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ cm^{-1} ظاهر شده‌اند، همچنین جذب کششی پیوند NH در ۳۴۷۰ cm^{-1} ظاهر شده است.

۲-۶-۲ (۳-۱-۲-نیتروفنیل)-۱H-۳،۲،۱-تری‌آزول-۴-ایل-متیل تیو-۱-۴-دی

هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۷b)

در طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۲۳ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیلن به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۷۵ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های حلقه آروماتیک متصل به تری‌آزین، حلقه آروماتیک متصل به حلقه تری‌آزول و NH تری‌آزین به صورت چندتایی در ۷/۰-۸/۵ ppm با سطح زیر پیک ده هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۸/۶ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۲۴ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۶۰۰ cm^{-1} و جذب کششی پیوند (NH) در ۳۴۰۰ cm^{-1} ظاهر شده‌اند. همچنین ناحیه ۱۳۴۰ و ۱۵۳۳ cm^{-1} ارتعاشات متقارن و نامتقارن مربوط به گروه نیترو ظاهر شده‌اند.

۲-۶-۳ (۳-۱-۳-نیتروفنیل)-۱H-۳،۲،۱-تری‌آزول-۴-ایل-متیل تیو-۱-۴-دی

هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۵۷c)

در طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۲۵ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیلن به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۷ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های حلقه آروماتیک متصل به تری‌آزین، پروتون موقعیت پارا نسبت به گروه نیترو در حلقه آروماتیک متصل به حلقه

تری آزول و NH تری آزین به صورت چندتایی در ppm ۷/۰-۸/۱ با سطح زیر پیک هفت هیدروژن، پروتون‌های موقعیت اورتو و متا نسبت به گروه نیترو در حلقه آروماتیک به صورت چندتایی در ppm ۸/۲-۸/۵ با سطح زیر پیک دو هیدروژن مشاهده می‌شود. همچنین پروتون موقعیت اورتو نسبت به گروه نیترو و حلقه آروماتیک به صورت یک قله ییکتایی در ppm ۸/۷ با سطح زیر پیک یک هیدروژن، پروتون C-H حلقه یی تری آزول به صورت یک قله یی یکتایی در ppm ۹/۰ با سطح زیر پیک یک هیدروژن و پروتون N-H حلقه یی بنزوتری آزین به صورت یک قله یی پهن در ppm ۱۲/۶ با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۲۶ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده 1440 cm^{-1} و جذب کششی پیوند (NH) در 3480 cm^{-1} ظاهر شده‌اند. در ناحیه 1340 و 1525 cm^{-1} ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن مربوط به گروه نیترو ظاهر شده است.

۲-۴-۶-۳-۱-۱-۴-۱-۲-۳-تری آزول-۴-ایل-متیل تیو-۴،۱-دی

هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۷d)

طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۲۷ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیلن به صورت یک قله یی یکتایی در ppm ۴/۸ با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های حلقه یی آروماتیک بنزوتری آزین و NH بنزوتری آزین به صورت چندتایی در ppm ۷/۰-۸/۷ با سطح زیر پیک پنج هیدروژن و پروتون‌های حلقه یی آروماتیک متصل به حلقه یی تری آزول به صورت چندتایی در ppm ۸/۱-۸/۷ با سطح زیر پیک چهار هیدروژن مشاهده می‌شود. همچنین پروتون C-H حلقه یی تری آزول به صورت یکتایی در ppm ۸/۶ با سطح زیر پیک یک هیدروژن و پروتون N-H حلقه یی بنزوتری آزین به صورت یک قله یی پهن در ppm ۱۲/۶ با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۲۸ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده 1600 cm^{-1} و جذب کششی پیوند (NH) در 3400 cm^{-1} ظاهر شده‌اند. در ناحیه 1340 و 1520 cm^{-1} ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن مربوط به گروه نیترو ظاهر شده است.

۲-۶-۵) ۳- {۱- (۳- کلروفنیل) -۱H-۲،۱-تری آزول-۴-ایل} -متیل تیو-۴،۱-دی

هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۷e)

طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۲۹ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیلن به صورت یک قله‌ی یکتایی در $4/7\text{ ppm}$ با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های آروماتیک و NH بنزوتری آزین را به صورت چندتایی در $6/9-8/3\text{ ppm}$ با سطح زیر پیک ده هیدروژن، پروتون C-H حلقه‌ی تری آزول به صورت یکتایی در $8/8\text{ ppm}$ با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۳۰ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده 1400 و 1600 cm^{-1} و جذب کششی پیوند (NH) در 3460 cm^{-1} ظاهر شده است.

۲-۶-۶) ۳- {۱- (۴- کلرو-۳-نیتروفنیل) -۱H-۲،۱-تری آزول-۴-ایل} -متیل تیو-۴،۱-دی

۴،۱-دی هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۷f)

طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۳۱ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیلن به صورت یک قله‌ی یکتایی در $4/8\text{ ppm}$ با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های آروماتیک و NH بنزوتری آزین را به صورت چندتایی در $7/0-8/7\text{ ppm}$ با سطح زیر پیک نه هیدروژن، پروتون C-H حلقه‌ی تری آزول به صورت یکتایی در $8/9\text{ ppm}$ با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۳۲ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۴۴۰ و ۱۶۰۰ cm^{-1} و جذب کششی پیوند (NH) در ۳۵۰۰ cm^{-1} ظاهر شده‌اند. همچنین در ناحیه ۱۳۵۰ و ۱۵۲۰ cm^{-1} ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن مربوط به گروه نیترو ظاهر شده است.

۲-۶-۷ (۴-۴) (۴-۱) دی‌هیدرو [e] ۴،۲،۱-تری‌آزین-۳-ایل تیو-۱H-۱-۲،۱-۳-تری‌آزول-۴-ایل) متیل تیو-بنزوئیک اسید (۵۷g)

طیف $^1\text{H-NMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۳۳ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیلن به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۷ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های آروماتیک و NH بنزوتتری‌آزین را به صورت چندتایی در ۶/۹-۸/۲ ppm با سطح زیر پیک ده هیدروژن، پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یکتایی در ۸/۸ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۳۴ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۴۶۰ و ۱۶۱۰ cm^{-1} و جذب کششی پیوند (NH) در ۳۴۸۰ cm^{-1} ظاهر شده‌اند. ارتعاش کششی پیوند OH اسیدی در ناحیه همچنین در ناحیه ۱۷۰۰ و ۱۷۴۰ cm^{-1} ارتعاشات مربوط به گروه کربونیل اسیدی ظاهر شده است.

۲-۶-۸ (۳-۱) (بنزیل-۱H-۱-۲،۱-تری‌آزول-۴-ایل) متیل تیو-۱-۴،۱-دی‌هیدرو بنزو [e] ۴،۲،۱-تری‌آزین (۶۱a)

در طیف $^1\text{H-NMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۳۵ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیلن متصل به گوگرد به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۶ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن متصل به نیتروژن حلقه تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۵/۵ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن قابل مشاهده می‌باشد. پروتون‌های آروماتیک به صورت چندتایی در

۷/۰-۷/۶ ppm با سطح زیر پیک نه هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یکتایی در ۸/۱ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود. همچنین پروتون N-H حلقه‌ی بنزوتتری‌آزین به صورت یکتایی در ۱۱/۲ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۳۶ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۴۴۰ و ۱۶۰۰ cm⁻¹، جذب کششی پیوند (CH) آروماتیک و آلیفاتیک به ترتیب در ۳۱۰۰ و ۲۹۲۰ تا ۳۰۰۰ cm⁻¹ ظاهر شده. همچنین جذب کششی پیوند (NH) در ۳۴۰۰ cm⁻¹ ظاهر شده است.

۲-۶-۹) ۳- {۱- (۲- کلروبنزیل) -H-۱،۲،۳- تری‌آزول-۴- ایل) -متیل تیو} -۴،۱-

دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین (۶۱b)

در طیف ¹H NMR این ترکیب (طیف ۴-۳۷ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیلن متصل به گوگرد به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۶ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن متصل به نیتروژن حلقه تری‌آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۵/۶ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن مشاهده می‌شود. پروتون‌های آروماتیک به صورت چندتایی در ۷/۰-۷/۶ ppm با سطح زیر پیک هشت هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یکتایی در ۸/۱ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۳۸ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۴۸۰ و ۱۶۰۰ cm⁻¹ و جذب کششی مربوط به پیوند C-H آروماتیک در ۳۱۰۰ cm⁻¹ و C-H آلیفاتیک در ۲۹۸۰ cm⁻¹ قابل مشاهده است. همچنین جذب کششی مربوط به پیوند N-H در ۳۵۰۰ cm⁻¹ مشاهده شده است.

۲-۶-۱۰) ۳- {۱- (۴- متیل بنزیل) -H-۱,۲,۳-تری آزول-۴- ایل)- متیل تیو}-۴,۱-

دی هیدروبنزو[e]-۴,۲,۱-تری آزین (۶۱c)

در طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۳۹ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل متصل به حلقه آروماتیک به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۲/۲ ppm با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن متصل به گوگرد به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۶ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن متصل به نیتروژن حلقه تری آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۵/۵ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن مشاهده می‌شود. پروتون‌های آروماتیک و NH حلقه بنزو تری آزین به صورت چندتایی در ۶/۶-۶/۹ ppm با سطح زیر پیک نه هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری آزول به صورت یکتایی در ۸/۱ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴-۴۰ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده ۱۴۶۰ و 1600 cm^{-1} و جذب کششی مربوط به پیوند C-H حلقه آروماتیک در 3100 cm^{-1} و C-H آلیفاتیک در 2750 cm^{-1} قابل مشاهده است، همچنین جذب کششی مربوط به پیوند N-H در 3450 cm^{-1} مشاهده شده است.

۲-۶-۱۱) ۳- {۱- (۴- متیل -H-۱,۲,۳-تری آزول-۴- ایل)- متیل تیو}-۴,۱-دی هیدروبنزو

[e]-۴,۲,۱-تری آزین (۶۱d)

در طیف $^1\text{HNMR}$ این ترکیب (طیف ۴-۴۱ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل متصل به نیتروژن حلقه تری آزول به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۰ ppm با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن متصل به گوگرد به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۶ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن مشاهده می‌شود. همچنین پروتون‌های آروماتیک به صورت چندتایی در

۶/۹-۷/۶ ppm با سطح زیر پیک چهار هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یکتایی در ۸/۰ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴۲-۴ ضمیمه)، جذب کششی پیوند (C=C) آروماتیک در محدوده 1600 cm^{-1} و جذب کششی مربوط به پیوند C-H حلقه آروماتیک در 3100 cm^{-1} و C-H آلیفاتیک در 2900 cm^{-1} قابل مشاهده است.

۲-۶-۱۲ (۴-۴-۱۱-۴-دی‌هیدرو[e]۴،۲،۱-تری‌آزین-۳-ایل تیو)-۱H-۳،۲،۱-

تری‌آزول-۴-ایل)-متیل تیو)-پروپان-۲-ون (۶۱e)

در طیف $^1\text{H-NMR}$ این ترکیب (طیف ۴۳-۴ ضمیمه)، پروتون‌های گروه متیل متصل به گروه کربونیل به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۲/۱ ppm با سطح زیر پیک سه هیدروژن، پروتون‌های گروه متیلن متصل به گوگرد به صورت یک قله‌ی یکتایی در ۴/۶ ppm با سطح زیر پیک دو هیدروژن قابل مشاهده می‌باشد. پروتون‌های آروماتیک و NH حلقه بنزو تری‌آزین به صورت چندتایی در ۶/۸-۷/۸ ppm با سطح زیر پیک پنج هیدروژن و پروتون C-H حلقه‌ی تری‌آزول به صورت یکتایی در ۸/۲ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن و پروتون N-H دیگر حلقه‌ی بنزو تری‌آزین به صورت یکتایی در ۱۲/۷ ppm با سطح زیر پیک یک هیدروژن مشاهده می‌شود.

در طیف IR این ترکیب (طیف ۴۴-۴ ضمیمه)، جذب کششی (C=C) آروماتیک در محدوده 1400 cm^{-1} ظاهر شده است. همچنین جذب کششی مربوط به C-H های حلقه آروماتیک در 3100 cm^{-1} و در 1720 cm^{-1} ارتعاش مربوط به گروه کربونیل مشاهده شده است.

۲-۷) نتیجه گیری

واکنش‌های کلیک، گستره وسیعی از علوم زیستی تا علوم مواد را در برمی‌گیرد. سادگی و انعطاف‌پذیری این واکنش‌ها منجر به کاربرد آنها در تمامی زمینه‌های شیمی و بیوشیمی شده است. در این تحقیق، مشتقات جدیدی از ترکیبات هتروسیکل ۳- $\{(1-(\text{آریل})-H-1,2,3-\text{تری آزول}-4-\text{ایل})-\text{متیل تیو}\}$ -۴،۱-دی‌هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری‌آزین و ۶-متیل-۳- $\{(1-(\text{آریل})-H-1,2,3-\text{تری آزول}-4-\text{ایل})-\text{متیل تیو}\}$ -۴،۲،۱-تری‌آزین-۵(H)-۴)-ون با استفاده از مواد اولیه قابل دسترس، در حضور کاتالیزگرهای ارزان قیمت و طی یک سری واکنش‌های تک‌ظرفی و به صورت جداگانه بر اساس اصول شیمی کلیک تهیه گردید.

از مزیت‌های این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-انجام واکنش در دمای اتاق یا 50°C که دمای بالایی نمی‌باشد و باعث کاهش مصرف انرژی می‌گردد.

۲- بهره بالای واکنش

۳ - تک ظرفی بودن واکنش که نیازی به جداسازی واسطه‌ها نیست در نتیجه بازده واکنش کاهش نمی‌یابد.


۴- زمان نسبتاً کوتاه واکنش

۵-انجام واکنش بدون نیاز به جو خنثی


۸-۲) آینده نگری

با توجه به این که حضور دو یا چند هسته فعال دارویی در یک ساختار واحد، سبب تقویت فعالیت بیولوژیکی و یا ایجاد خواص بیولوژیکی برای آن ترکیب می گردد، می توان تری آزول های متصل به سایر حلقه های هتروسیکلی را تهیه کرد که به دو مورد اشاره می گردد:

۱- ۳،۲،۱-تری آزول های متصل به حلقه هتروسیکلی ۴،۲،۱-تری آزول



۲- ۳،۲،۱-تری آزول های متصل به حلقه هتروسیکلی کینوکسالین



فصل سوم

بخش تجریمی

۳) بخش تجربی

۳-۱) تکنیک‌های عمومی

۳-۱-۱) مواد اولیه

مواد اولیه شیمیایی از شرکت‌های تجاری اکروس^۱، فلوکا^۲ و مرک^۳ خریداری شده و بدون خالص‌سازی مورد استفاده قرار گرفته است، حلال‌ها از برخی از شرکت‌های داخلی تهیه شدند. پیشرفت واکنش‌ها توسط کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) با استفاده از صفحه‌های سیلیکاژل مرک 60F 254 کنترل شد و ترکیبات توسط تابش‌دهی با نور ماوراء بنفش (UV) با طول موج‌های ۲۵۴ nm و ۳۶۶ nm و با بوسیله نشر کردن با بخارات ید مشاهده شدند. فراورده‌های تهیه شده توسط تکنیک‌های استخراج، تبلور مجدد و ستون کروماتوگرافی جداسازی و خالص‌سازی شدند. در روش ستون کروماتوگرافی از سیلیکاژل مرک 100F 254 برای جداسازی و خالص‌سازی استفاده شد.

۳-۱-۲) دستگاه‌ها

رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (^1H NMR) ۸۰ MHz توسط بخش آنالیز دستگاهی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام گرفته است. چندگانگی رزونانس مغناطیسی هسته بصورت یکتایی (S)، چندتایی (m)، دوتایی (d) مشخص شده‌اند. طیف‌های مادون قرمز (IR)، با استفاده از دستگاه IR Spectrometer 470 Shimadzu ثبت شده‌اند. طیف‌های ترکیبات به صورت قرص KBr گرفته شده است. فرکانس‌های ارتعاشی در واحد عدد موجی (cm^{-1}) می‌باشند. نقطه‌ی ذوب ترکیبات با استفاده از دستگاه Bamstead / Electrothermal اندازه‌گیری شده است.

1. Across

۲. fluka

2. Merck

۳-۲) تهیه آزیدهای آروماتیک

۳-۲-۱) سنتز آزیدهای آلی مایع

ابتدا در یک بالن ۱۰۰ mL، نسبت مساوی (۲۵ mL) از آب مقطر و (۲۵ mL) اسید هیدروکلریک ۱۲ M ریخته و در حمام یخ قرار داده شد. سپس آنیلین (0.96 mL, 10 mmol) به آن اضافه شد و به وسیله همزن مغناطیسی به مدت ۳۰ دقیقه هم زده شد. سدیم نیتريت (0.828 g, 12 mmol) در ۷/۵ mL آب حل شد و طی ۴۵ دقیقه و به صورت قطره قطره به بالن اضافه شد. سدیم آزید (0.78 g, 12 mmol) در ۴ mL آب حل گردید و به آرامی به مخلوط واکنش اضافه گردید و مخلوط واکنش به مدت نیم ساعت به سرعت همزده شد. بعد از کامل شدن واکنش، به وسیله دی کلرومتان محصول استخراج شد. با تبخیر حلال رسوب به دست آمده در حلال اتانول متبلور گردید [۸۴].

۳-۲-۲) سنتز آزیدهای آلی جامد

ابتدا در یک بالن ۱۰۰ mL، نسبت مساوی از آب مقطر و اسید هیدروکلریک ۱۲ M ریخته و در حمام یخ قرار داده شد، سپس ۴-نیتروانیلین (1.38 g, 10 mmol)، را به بالن اضافه کرده و توسط همزن مغناطیسی به مدت ۴۵ دقیقه همزده شد، بعد از حل شدن کامل ترکیب، سدیم نیتريت (1 g, 15 mmol) در ۴ mL آب حل شد و طی ۴۵ دقیقه به صورت قطره قطره به بالن اضافه شد. سدیم آزید (0.97 g, 15 mmol) در ۴ mL آب حل شد و به صورت قطره قطره به مخلوط واکنش اضافه شد. بعد از رسیدن دمای بالن به دمای محیط، رسوب صاف شده و با آب مقطر شست و شو داده شد تا آب شستشو رسوب به pH خنثی رسید، سپس رسوب بدست آمده در اتانول متبلور شد [۸۵].

۳-۳) تهیه ۶-متیل-۳-تیواکسو-۴،۳-دی هیدرو-۴،۲،۱-تری آزین-

۵(۴H)-اون (۶۴)

تیوسمی کاربازید (0.914 g, 10 mmol) و نمک سدیم پیرووات (1.1 g, 10 mmol) در ۱۰ mL آب مقطر به مدت ۸ ساعت رفلاکس شد، (پیشرفت واکنش به وسیله TLC بررسی شد) محلول حاصل با اسید هیدروکلریک ۱۰٪ اسیدی شد، رسوب بدست آمده صاف و بوسیله آب متبلور گردید [۸۲].

۴-۳) تهیه ۶-متیل-۳-(پروپ-۲-اینیل تیو)-۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-اون

(۵۳)

ابتدا سدیم (0.15 g, 6.5 mmol)، در ۲۵ mL متانول و به مدت ۳۰ دقیقه هم زده شد. ترکیب (۶۱) (0.716 g, 5 mmol)، به محلول اضافه شد. پروپارژیل برمید (۶۵) (0.64 mL, 5.7 mmol) به صورت قطره قطره به مخلوط واکنش اضافه گردید. پس از اطمینان از اتمام واکنش به وسیله TLC، مخلوط واکنش به وسیله هیدروکلریک اسید رقیق اسیدی و رسوب سفید رنگ ایجاد شده صاف گردید. رسوب بعد از خشک شدن در آب متبلور شد [۸۲].

۵-۳) تهیه مشتقات ۶-متیل-۳-} (۱-آریل-۱H-۲،۱-۳-تری آزول-۴-ایل)

متیل تیو-۴،۲،۱-تری آزین-۵(۴H)-اون (۵۵)

ترکیب (۵۳) (0.09 g, 0.5 mmol)، و آزید آروماتیک (0.6 mmol)، در ۳ mL حلال N,N-دی متیل فرم آمید (DMF) حل شد، مس(II) استات (0.001 g, 10 mol%) و سدیم آسکورات (0.002 g, 20 mol%) به مخلوط واکنش اضافه شد. واکنش در دمای محیط هم زده شد. پایان

واکنش توسط TLC تأیید شد. حلال واکنش تبخیر و رسوب به دست آمده توسط ستون کروماتوگرافی با حلال کلوفر-متانول با نسبت (۱:۳۰) خالص گردید. دمای ذوب، بهره‌ی واکنش و مشخصات طیفی ترکیبات سنتز شده به صورت زیر می‌باشد:

• ۶-متیل-۳- $\{(1\text{-فنیل-}1H\text{-}۳,۲,۱\text{-تری آزول-}۴\text{-ایل})\text{-متیل تیو}\}$ -۴,۲,۱-

تری آزین-۵(۴H)-اون (۵۵a)

دمای ذوب: $۲۲۳\text{--}۲۲۱\text{ }^{\circ}\text{C}$ زمان واکنش: ۵ h بهره واکنش: ۹۲٪

$^1\text{H-NMR}$, (80 MHz, DMSO- d_6): 8.7 (s, 1H, CH), 7.8-8.0 (m, 5H, ArH), 4.5 (s, 2H, CH₂), 2.1 (s, 3H, CH₃).

IR, (KBr, cm^{-1}): 3450 (NH), 3100, 1617 (C=O), 1359, 1508, 1261, 759 cm^{-1} .

• ۶-متیل-۳- $\{(1\text{-نیترو فنیل-}۲\text{-}1H\text{-}۳,۲,۱\text{-تری آزول-}۴\text{-ایل})\text{-متیل تیو}\}$ -۴,۲,۱-

تری آزین-۵(۴H)-اون (۵۵b)

دمای ذوب: $۲۱۶\text{--}۲۱۴\text{ }^{\circ}\text{C}$ زمان واکنش: ۳ h بهره واکنش: ۹۰٪

$^1\text{H-NMR}$, (80 MHz, DMSO- d_6): 8.6 (s, 1H, CH), 7.7-8.4 (m, 4H, ArH), 4.6 (s, 2H, CH₂), 2.1 (s, 3H, CH₃).

IR, (KBr, cm^{-1}): 3450 (NH), 2850, 2990, 3100, 1640 (C=O), 1458, 1530, 1340 (NO₂), 850 cm^{-1} .

- ۶-متیل-۳- $\{(1)-(3\text{-نیترو فنیل})-1H-3,2,1\text{-تری آزول-۴-ایل}\}$ -متیل تیو- $\{$

۴,۲,۱-تری آزین-۵(۴H)-اون (۵۵c)

دمای ذوب: $226-227^{\circ}\text{C}$ زمان واکنش: ۱h بهره واکنش: ۹۶٪

$^1\text{H-NMR}$, (80 MHz, DMSO- d_6): 8.9 (s, 1H, CH), 8.0-8.5 (m, 4H, ArH), 4.6 (s, 2H, CH₂), 2.1 (s, 3H, CH₃).

IR, (KBr, cm^{-1}): 3500 (NH), 2800,2990, 3100, 1640 (C=O), 1460, 1345,1520 (NO₂), 850 cm^{-1} .

- ۶-متیل-۳- $\{(1)-(4\text{-نیترو فنیل})-1H-3,2,1\text{-تری آزول-۴-ایل}\}$ -متیل تیو- $\{$

۴,۲,۱-تری آزین-۵(۴H)-اون (۵۵d)

دمای ذوب: $25^{\circ}\text{C}-252$ زمان واکنش: ۴h بهره واکنش: ۸۶٪

$^1\text{H-NMR}$, (80 MHz, DMSO- d_6): 8.9 (s, 1H, CH), 8.0-8.5 (m, 4H, ArH), 4.5 (s, 2H, CH₂), 2.1 (s, 3H, CH₃)

IR, (KBr, cm^{-1}): 3500 (NH), 2800,2990, 3100, 1630 (C=O), 1460, 1340,1520 (NO₂), 850 cm^{-1} .

- ۶-متیل-۳- $\{(1)-(3\text{-کلرو فنیل})-1H-3,2,1\text{-تری آزول-۴-ایل}\}$ -متیل تیو- $\{$

۴,۲,۱-تری آزین-۵(۴H)-اون (۵۵e)

دمای ذوب: $226-227^{\circ}\text{C}$ زمان واکنش: ۵h بهره واکنش: ۹۱٪

$^1\text{H-NMR}$, (80 MHz, DMSO- d_6): 8.8 (s, 1H, CH), 7.5-8.0 (m, 4H, ArH), 4.5 (s, 2H, CH₂), 2.1 (s, 3H, CH₃)

IR, (KBr, cm^{-1}): 3480 (NH), 2800,2990, 3100, 1640 (C=O), 1460, 860, 780 cm^{-1} .

- ۶-متیل-۳-((۱-((۴-کلرو-۳-نیتروفنیل)-۱H-۳,۲,۱-تری آزول-۴-ایل))-

متیل تیو}-۴,۲,۱-تری آزین-۵(۴H)-اون (۵۵f)

دمای ذوب: ۲۴۶-۲۴۴ °C زمان واکنش: ۱h بهره واکنش: ۸۷٪

¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 8.7 (s, 1H, ArH), 7.9-8.3 (m, 2H, ArH), 8.8 (s, 1H, CH), 4.3(s, 2H, CH₂), 2.1 (s, 3H, CH₃).

IR, (KBr, cm⁻¹): 3460 (NH), 2800,2990, 3100, 1630 (C=O), 1460, 1350,1530 (NO₂), 740 cm⁻¹.

- ۴-((۴-متیل-۵-اکسو-۵,۴-دی هیدرو-۴,۲,۱-تری آزین-۳-ایل تیو))-

متیل {۱H-۳,۲,۱-تری آزول-۱-ایل)-بنزوئیک اسید (۵۵g)

دمای ذوب: ۲۳۷-۲۳۶ °C زمان واکنش: ۵h بهره واکنش: ۹۰٪

¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 8.7 (s, 1H, CH), 7.9-8.3 (m, 4H, ArH), 4.6(s, 2H, CH₂), 2.1 (s, 3H, CH₃).

IR, (KBr, cm⁻¹): 3410 (NH), 2880,2990, 3100, 1700 (C=O_{acid}), 1616 (C=O), 1480, 750 cm⁻¹.

۳-۶) تهیه ۲,۱-دی هیدروبنزو[e]-۴,۲,۱-تری آزین (۶۸)

۲,۱-فنیلن دی آمین ۶۷ (1.1g, 10 mmol) و تیوسمی کاربازید ۶۲ (0.91g, 10 mmol) در هاون به خوبی ساییده شد، مخلوط درون بالن ۵۰mL ریخته و به آرامی تا دمای ۲۲۰°C حرارت داده شد. ابتدا مخلوط جامد به صورت محلول درآمد و در ۱۹۰°C جامد شد. دمای واکنش تا دمای ۲۲۰°C افزایش یافت. پس از کامل شدن واکنش، مخلوط تا دمای اتاق سرد شد. جامد به دست آمده را در آب جوش ریخته و رسوب حاصل صاف شد [۸۳].

۳-۷) تهیه ۳- (پروپ-۲-اینیل تیو)-۴،۱-دی هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-

تری آزین (۵۶)

سدیم (0.15 g, 6.5 mmol) در ۲۵ mL متانول حل و به مدت ۳۰ دقیقه هم زده شد. ترکیب (۶۸) (0.825 g, 5 mmol) به محلول فوق اضافه شد. سپس پروپارژیل برمید (۶۵) (0.64 mL, 5.7 mmol) به صورت قطره قطره به مخلوط واکنش اضافه گردید. پایان واکنش به وسیله TLC، حلال واکنش تبخیر و رسوب ایجاد شده با آب شسته و در متانول متبلور شد.

۳-۸) تهیه مشتقات ۳- {(۱-آریل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل

تیو }-۴،۱-دی هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۷)

ترکیب ۷۸ (0.1 g, 0.5 mmol) و آزید آروماتیک (0.6 mmol) در ۳ mL N,N-دی متیل فرم آمید (DMF) حل شد. مس(II) استات (0.001 g, 10 mol%) و سدیم آسکوربات (0.002 g, 20 mol%) به مخلوط واکنش اضافه شد. واکنش در دمای محیط هم زده شد. پس از تأیید پایان واکنش به وسیله TLC، حلال واکنش تبخیر و رسوب به دست آمده توسط ستون کروماتوگرافی با حلال کلروفرم-متانول با نسبت (۱:۳۰) خالص گردید. دمای ذوب، بهره‌ی واکنش و مشخصات طیفی ترکیبات سنتز شده به صورت زیر می باشد:

• ۳- {(۱-فنیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو }-۴،۱-دی -

هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۵۷a)

دمای ذوب: ۱۵۲-۱۵۰ °C زمان واکنش: ۲h بهره واکنش: ۸۱٪

¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 8.7 (s, 1H, CH), 7.0-8.0 (m, 9H, ArH), 4.7 (s, 2H, CH₂).

IR, (KBr, cm⁻¹): 3450 (NH), 3100, 1500, 1400, 1380, 1050, 1100, 800 cm⁻¹.

- ۳- (۱- (۲- نیترو فنیل) - ۱H - ۳، ۲، ۱ - تری آزول - ۴ - ایل) - متیل تیو - ۴، ۱ - دی -

هیدروبنزو [e] - ۴، ۲، ۱ - تری آزین (۵۷b)

دمای ذوب: ۱۶۰ - ۱۵۹ °C زمان واکنش: ۴h بهره واکنش: ۸۵٪

¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 12.6 (b, 1H, NH), 8.6 (s, 1H, CH),

8.1-8.5 (m, 4H, ArH), 6.9-7.6 (m, 5H, ArH, NH), 4.7 (s, 2H, CH₂).

IR, (KBr, cm⁻¹): 3400 (NH), 3136, 1512, 1429, 1348, 1533 (NO₂), 1348, 750 cm⁻¹.

- ۳- (۱- (۳- نیترو فنیل) - ۱H - ۳، ۲، ۱ - تری آزول - ۴ - ایل) - متیل تیو - ۴، ۱ - دی -

هیدروبنزو [e] - ۴، ۲، ۱ - تری آزین (۵۷c)

دمای ذوب: ۹۸ - ۹۶ °C زمان واکنش: ۱h بهره واکنش: ۹۵٪

¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 9.0 (s, 1H, CH), 8.8 (s, 1H, ArH),

8.2-8.4 (m, 2H, ArH), 6.9-8.0 (m, 7H, ArH, 2NH), 4.7 (s, 2H, CH₂).

IR, (KBr, cm⁻¹): 3400 (NH), 1530, 1350 (NO₂), 1540, 890, 800, 740 cm⁻¹.

- ۳- (۱- (۴- نیترو فنیل) - ۱H - ۳، ۲، ۱ - تری آزول - ۴ - ایل) - متیل تیو - ۴، ۱ - دی -

هیدروبنزو [e] - ۴، ۲، ۱ - تری آزین (۵۷d)

دمای ذوب: ۲۱۴ - ۲۱۳ °C زمان واکنش: ۲h بهره واکنش: ۸۵٪

¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 9.0 (s, 1H, CH), 8.1-8.5 (m, 4H, ArH),

7.0-7.5 (m, 6H, ArH, 2NH), 4.7 (s, 2H, CH₂).

IR, (KBr, cm⁻¹): 3400 (NH), 1540, 1350 (NO₂), 850 cm⁻¹.

- ۳- (۱- (۳- کلرو فنیل) - $1H$ -۳،۲،۱- تری آزول-۴- ایل) -متیل تیو-۴،۱- دی-

هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱- تری آزین (۵۷e)

دمای ذوب: $220-222^{\circ}\text{C}$ زمان واکنش: ۱h بهره واکنش: ۹۲٪

$^1\text{H-NMR}$, (80 MHz, DMSO- d_6): 8.8 (s, 1H, CH), 6.9-8.3 (m, 10H, ArH, NH), 4.7 (s, 2H, CH_2).

IR, (KBr, cm^{-1}): 3400 (NH), 3100, 1500, 1400, 1380, 1100, 800 cm^{-1} .

- ۳- (۱- (۳- کلرو-۴- نیترو فنیل) - $1H$ -۳،۲،۱- تری آزول-۴- ایل) -متیل تیو-۴،۱- دی-

۴،۱- دی هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱- تری آزین (۵۷f)

دمای ذوب: $180-181^{\circ}\text{C}$ زمان واکنش: ۲h بهره واکنش: ۹۰٪

$^1\text{H-NMR}$, (80 MHz, DMSO- d_6): 8.9 (s, 1H, CH), 7.0-8.7 (m, 9H, ArH), 4.7 (s, 2H, CH_2).

IR, (KBr, cm^{-1}): 3470 (NH), 1520, 1340 (NO_2), 1540, 1260, 1040, 740 cm^{-1} .

- ۴- (۱- (۴،۱- دی هیدرو[e]-۴،۲،۱- تری آزین-۳- ایل تیو) - $1H$ -۳،۲،۱- تری آزول-۴- ایل) -متیل تیو) بنزوئیک اسید (۵۷g)

دمای ذوب: $252-251^{\circ}\text{C}$ زمان واکنش: ۳h بهره واکنش: ۸۸٪

$^1\text{H-NMR}$, (80 MHz, DMSO- d_6): 8.8 (s, 1H, CH), 7.6-8.3 (m, 6H, ArH, 2NH), 6.9-7.5 (m, 4H, ArH), 4.6 (s, 2H, CH_2).

IR, (KBr, cm^{-1}): 3480 (NH), , 3100, 2800, 1720 ($\text{C}=\text{O}_{\text{acide}}$), 1700, 1680, 1600, 1420, 1260, 760, 720 cm^{-1} .

۳-۹) تهیه مشتقات ۶-متیل-۳-((۱-آریل-۱H-۳,۲,۱-تری آزول-۴-

ایل) ۶-متیل تیو-۴,۲,۱-تری آزین-۵-(۴H)-اون (۶۰)

در یک بالن ۲۵ میلی لیتری لیتری ترکیب ۵۳ (0.09 g, 0.5 mmol)، سدیم آزید (0.052 g, 0.8 mmol) و هالیدآلیفاتیک (0.6 mmol) در DMF (۳mL) و آب (۰/۵ mL) حل شد. مس(II) استات (0.001g, 10 mol%) و سدیم آسکوربات (0.002g, 20 mol%) به ظرف واکنش اضافه شد. واکنش در دمای محیط هم زده شد. پس از تأیید پایان واکنش به وسیله TLC حلال واکنش تبخیر و رسوب بدست آمده توسط ستون کروماتوگرافی با حلال کلروفرم-متانول با نسبت (۱:۳۰) خالص گردید.

• ۶-متیل-۳-((۱-اکسو پروپیل)-۲-اکسو پروپیل)-۱H-۳,۲,۱-تری آزول-۴-یل)-

۶-متیل تیو)-۴,۲,۱-تری آزین-۵-(۴H)-اون (۶۰a)

دمای ذوب: ۱۹۱-۱۹۰ °C زمان واکنش: ۶h بهره واکنش: ۷۵٪

¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 7.9 (s, 1H, CH), 5.4 (s, 2H, CH₂-N), 4.5 (s, 2H, CH₂-S), 2.2 (s, 3H, CH₃), 2.1 (s, 3H, CH₃).

IR, (KBr, cm⁻¹): 3472 (NH), , 3168, 2944, 2784, 1731 (C=O), 1596, 1539, 1456, 1360, 1257, 1059, 784, 547 cm⁻¹.

• ۶-متیل-۳-((۱-۴-متیل بنزیل)-۲-۴-متیل تیو)-۱H-۳,۲,۱-تری آزول-۴-یل)-

۴,۲,۱-تری آزین-۵-(۴H)-اون (۶۰b)

دمای ذوب: ۲۰۵-۲۰۳ °C زمان واکنش: ۲h بهره واکنش: ۸۰٪

¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 8.0 (s, 1H, CH), 7.1-7.2 (m, 4H, ArH), 5.5 (s, 2H, CH₂-N), 4.6 (s, 2H, CH₂-S), 2.1 (s, 3H, CH₃), 2.3 (s, 3H, CH₃).

IR, (KBr, cm^{-1}): 3455 (NH), 3152, 2950, 2736, 1619 (C=O), 1590, 1523, 1459, 1363, 1257, 1040, 840, 780, 770, 550 cm^{-1} .

• ۶-متیل-۳-((۱-۴-نیتروبنزیل)-۱H-۳,۲,۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو)-

۴,۲,۱-تری آزین-۵(H۴)-اون (۶۰c)

دمای ذوب: ۱۶۶-۱۶۵ °C زمان واکنش: ۳h بهره واکنش: ۸۵٪

$^1\text{H-NMR}$, (80 MHz, DMSO- d_6): 8.1 (s, 1H, CH), 8.2-8.3 (d, 2H, ArH), 7.4-7.6 (d, 2H, ArH), 5.8 (s, 2H, $\text{CH}_2\text{-N}$), 4.4 (s, 2H, $\text{CH}_2\text{-S}$), 2.1 (s, 3H, CH_3).

IR, (KBr, cm^{-1}): 3450 (NH), 3110, 2800, 1620 (C=O), 1520, 1342 (NO_2), 1260, 1040, 840, 738, 540 cm^{-1} .

۳-۱۰) تهیه مشتقات ۳-((۱-آریل)-۱H-۳,۲,۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل

تیو)-۴,۱-دی هیدروبنزو[e]-۴,۲,۱-تری آزین (۶۱)

ترکیب ۵۶ (0.1 g, 0.5 mmol)، سدیم آزید (0.04 g, 0.6 mmol) و هالید آلیفاتیک (0.6 mmol) در اتانول (۴ mL) مغناطیسی حل شد، سپس مس (II) استات (0.001 g, 10 mol%) و سدیم آسکوربات (0.002 g, 20 mol%) به مخلوط واکنش اضافه شد. واکنش در دمای محیط هم زده شد. پس از تأیید پایان واکنش به وسیله TLC، حلال واکنش تبخیر و رسوب بدست آمده توسط ستون کروماتوگرافی با حلال کلروفرم-متانول با نسبت (۱:۳۰) خالص گردید.

دمای ذوب، بهره‌ی واکنش و مشخصات طیفی ترکیبات سنتز شده به صورت زیر می‌باشد:

- ۳- {۱- (بنزیل) -۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} -متیل تیو-۴،۱-دی-

هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۶۱a)

دمای ذوب: ۱۷۶ - ۱۷۷ °C زمان واکنش: ۱۲ h بهره واکنش: ۷۹٪

¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 11.2 (b, 1H, NH), 8.1 (s, 1H, CH),

7-7.6 (m, 9H, ArH), 5.6 (s, 2H, CH₂-N), 4.6 (s, 2H, CH₂-S).

IR, (KBr, cm⁻¹): 3450 (NH), 3100, 1400, 740 cm⁻¹.

- ۳- {۱- (۲-کلروبنزیل) -۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} -متیل تیو-۴،۱-دی-

هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۶۱b)

دمای ذوب: ۱۷۷ - ۱۷۸ °C زمان واکنش: ۳h بهره واکنش: ۹۰٪

¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 8.1 (s, 1H, CH), 6.9-7.6 (m, 9H, ArH, NH),

5.7 (s, 2H, CH₂-N), 4.6 (s, 2H, CH₂-S).

IR, (KBr, cm⁻¹): 3500 (NH), 2950, 1520, 1400, 1340, 1040, 1100, 800, 750 cm⁻¹.

- ۳- {۱- (۴-متیل بنزیل) -۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل} -متیل تیو-۴،۱-دی-

هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۶۱c)

دمای ذوب: ۸۲ - ۸۳ °C زمان واکنش: ۴h بهره واکنش: ۸۸٪

¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 8.1 (s, 1H, CH), 6.9-7.6 (m, 9H, ArH, NH),

5.5 (s, 2H, CH₂-N), 4.6 (s, 2H, CH₂-S), 2.2 (s, 3H, CH₃).

IR, (KBr, cm⁻¹): 3500 (NH), 3088, 2944, 1606, 1430, 1270, 1056, 854 cm⁻¹.

- ۳- (۱-متیل-۱H-۳،۲،۱-تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو-۴،۱-دی-

هیدروبنزو[e]-۴،۲،۱-تری آزین (۶۱d)

دمای ذوب: wax زمان واکنش: ۴h بهره واکنش: ۷۵٪

¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 8.0 (s, 1H, CH), 6.9-7.6 (m, 4H, ArH), 4.6 (s, 2H, CH₂-S), 4.0 (s, 3H, CH₃).

IR, (KBr, cm⁻¹): 3500 (NH), 3072, 2800, 2656, 1430, 1552, 1427, 1267, 748 cm⁻¹.

- ۴- (۴،۱-دی هیدرو[e]-۴،۲،۱-تری آزین-۳-ایل تیو)-۱H-۳،۲،۱-

تری آزول-۴-ایل)-متیل تیو) پروپان-۲-اون (۶۱e)

دمای ذوب: ۱۷۱-۱۷۰ °C زمان واکنش: ۴h بهره واکنش: ۸۶٪


¹H-NMR, (80 MHz, DMSO-d₆): 12.7 (b, 1H, NH), 8.0 (s, 1H, CH), 6.8-7.7 (m, 5H, ArH, NH), 5.7 (s, 2H, CH₂-N), 4.6 (s, 2H, CH₂-S).

IR, (KBr, cm⁻¹): 3500 (NH), 3152, 3056, 2960, 2608, 1718, 1408, 1353, 1270, 1225, 1177, 979, 745, 560 cm⁻¹.


ضمیمه

طیف‌های IR, ^1H -NMR



(۴) ضمیمه




طیف ۱-۳۴: طیف ¹H-NMR ترکیب شماره ۵۵a





طیف ۲-۴: طیف IR ترکیب شماری (۵۵a)




طیف ۳-۴: ¹H-NMR ترکیب شماره‌ی (۵۵b)





طیف ۴-۴: طیف IR ترکیب شماره ۵۵b)




طیف ۴-۵: ترکیب شماره ۱ (۵۵C)





طیف ۴-۶: طیف IR ترکیب شماری (۵۵۰)




طیف ۷-۴: طیف ¹H-NMR ترکیب شماره‌ی (۵۵d)





طیف IR ترکیب شماری (۵۵d)




طیف ۹-۴: ¹H-NMR ترکیب شماره ۵۵۵ (۵۵۵)





طیف ۱۰۰۴: طیف FT-IR ترکیب شماره‌ی (۵۵e)




طیف ۱۱-۴: ¹H-NMR ترکیب شماره‌ی (۵۵f)





طیف IR ترکیب شماره‌ی (۵۵f)




طیف ۱۳-۴: طیف ¹H-NMR ترکیب شماره‌ی (۵۵g)








طیف ۱۵-۴: طیف $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۶۰۲)





طیف ۱۶-۴: طیف IR ترکیب شماری (۶۰a)




طیف ۱۷-۴: ¹H NMR ترکیب شماره ی (۶۰.ب)





طیف IR ترکیب شماره ی ۱۸-۴ (۶۰b)




طیف ¹H NMR ترکیب شماره ی ۱۹-۴ (۴۰°C)




طیف ۷-۴: IR ترکیب شماره‌ی (۶۰C)




طیف ¹H-NMR ترکیب شماره‌ی (5Va)




طیف IR ترکیب شماره‌ی (۵۷a)




طیف ۴-۷: طیف ^1H -NMR ترکیب شماره ۵۷b




طیف ۲۴-۴: طیف FT-IR ترکیب شماری (۵۷b)




طیف ۴-۲۵: طیف $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره ۱ (۵۷)





طیف ۲۶-۴: طیف IR ترکیب شماره‌ی (۵۷۷)




طیف ۴-۲۷: ترکیب شماره‌ی (۵۷d)





طیف IR ترکیب شماره ی (۵۷د)




طیف $^1\text{H-NMR}$: ترکیب شماره ۵ (۵۷)





طیف ۳-۴: طیف IR ترکیب شماره‌ی (۵۷۶)




طیف ۳-۴: طیف ¹H-NMR ترکیب شماره‌ی (۵۷f)





طیف IR ترکیب شماره‌ی (۵۷f)




طیف ۳۳-۴: طیف $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شمارگی (۵۷g)





طیف ۴-۴: طیف IR ترکیب شماری (۵۷g)




طیف ۴-۳۵: طیف ¹H-NMR ترکیب شماره ۱ (۶۱)





طیف IR ترکیب شماره‌ی (۴۱a)




طیف $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره ی (۶۱b)





طیف ۳۸-۴: IR ترکیب شماری (۶۱b)




طیف ۳-۴: طیف ¹H-NMR ترکیب شماره ۱ (۶)





طیف ۴-۴: طیف IR ترکیب شماره‌ی (۶۱C)




طیف ۴-۴۱: طیف $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۶۱د)



طیف IR ترکیب شماره‌ی (۶۱d)



طیف ۴-۴۳: طیف $^1\text{H-NMR}$ ترکیب شماره‌ی (۴۱e)



طیف ۴-۴۴: IR ترکیب شماره‌ی (۴۱۹)

منابع

- [1] M. Dunkle, C. West, A. Pereira, S. der Plas, A. Maddar and W. Farrell, *Chromatogr*, **2014**, 6, 85.
- [2] Schramm H., Saak W., Hoenke C., Christoffers J., *Eur. J. Org. Chem.* **2010**, 1745.
- [3] Kolb H. C., Walsh, J. C. *Chimia*, **2010**, 64, 29.
- [4] Wang Q., Chan T. R., Hilgraf R., Fokin V. V., Sharpless K. B., Finn M., *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, 125, 3192.
- [5] Hong V., Presolski S. I., Ma C., Finn M. G., *Angew. Chem. Int. Ed.* **2009**, 48, 9879.
- [6] Niwano Y., Seo A., Kanai K., Hamaguchi H., Uchida K., Yamaguchi H., *Antimicrob. Agents Chemother.* **1994**, 38, 2204.
- [7] Daugaard, E. A.; (2009), PhD. thesis, "Functional Materials by Click Chemistry", Danish Polymer Centre, Technical University of Denmark.
- [8] Kolb C. H., Finn M. G., Sharpless K. B., *Angew. Chem. Int. Ed.* **2001**, 40, 2004.
- [9] Blum C. A., Zheng X., De Lombaert S., *J. Med. Chem.* **2004**, 47, 2318.
- [10] Coura J. R., De Castro S. L., *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*, **2002**, 97, 3.
- [11] Breccia A., Cavalleri B., Adams G. E. In "Nitroimidazoles; Chemistry, Pharmacology and Clinical Applications", Plenum Press, New York, **1982**.
- [12] Huisgen R., "1,3-Dipolar cycloadditions-Introduction, survey, mechanism. Padwa A, editor. 1,3-Dipolar cycloaddition chemistry. New York: Wiley; **1984**.
- [13] Rostovtsev V. V., Green L. G., Fokin V. V., Sharpless K. B., *Angew. Chem. Int. Ed.* **2002**, 41, 2596.
- [14] Totobenazara J., Burke A. J., *Tetrahedron Lett.* **2015**, 56, 2853.
- [15] Bohacek R. S., McMartin C., Guida W. C., *Med. Res. Rev.* **1996**, 16, 3.
- [16] Chu C., Liu R., *Chem. Soc. Rev.* **2011**, 40, 2177.
- [17] Chattopadhyay B., Gevorgyan V., *Angew. Chem. Int. Ed.* **2012**, 51, 862.
- [18] Murthy Y. L. N., Samsonu D., Diwakar B.S., *Org. Commun.* **2013**, 6, 125.
- [19] Anderson M. O., Zhang J., Liu Y., Yao C., Phuan P. W., Verkman, *J. Med. Chem.* **2012**, 55, 5942.

- [20] Haider S., Alam M. S., Hamid H., **2014**, *1*, 12.
- [21] Bourne Y, Kolb H. C., Radic Z., Sharpless K. B., Taylor P., Marchot P., *Acad. Sci. USA*. **2004**, *101*, 1449.
- [22] Whiting M., Muldoon J., Lin Y. C., Silverman S. M., Lindstron W., Olson A. J., *Angew. Chem. Int. Ed.* **2006**, *45*, 1435.
- [23] Horne W. S., Yadav M. K., Stout C. D., Ghadiri M. R., *J. Amer. Chem. Soci.* **2004**, *126*, 15366.
- [24] Appukkuttan P., Dehaen, W., Fokin V. V., Eycken E. V., *Org. Lett.* **2004**, *6*, 4223.
- [25] Dehaen Wim, Bakulev ,Vasiliy A., in: "Biological Properties of 1H-1,2,3- and 2H-1,2,3-Triazoles", *Springer-Verlag*, 124, 117, **2015**.
- [26] Yan Z. Y., Niu Y. N., Wei H. L., et al, *Tetrahedron Asymmetry*, **2006**, *17*, 3288.
- [27] Yoshida Y., Takizawa S., Sasai H., *Tetrahedron Asymmetry*, **2012**, *23*, 843.
- [28] Pereira D., Fernandes P., *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2001**, *21*, 510.
- [29] Lima-Neto R. G., Cavalcante N. N. M., Srivastava R. M. et al, *Molecules*, **2012**, *17*, 5882.
- [30] Kategaonkar A. H., Shinde P. V., *Eur. J. Med. Chem.*, **2010**, *45*, 3142.
- [31] Leaver D. J., Dawson R. M., White J. M., *Org. Biomol. Chem.*, **2011**, *9*, 8465.
- [32] Im C., Maiti S. N., Micetich R. G., *J. Antibiot.* **1994**, *47*, 1030.
- [33] Palhagen S, Canger R, Henriksen O et al, *Epilepsy Res*, **2001**, *43*:115–124.
- [34] Jorda ~o A. K., Ferreira V. F., Lima E. S., *Bioorg. Med. Chem.* **2009**, *17*, 3713.
- [35] Menegatti R., Cunha A. C., Ferreira V. F., *Bioorg. Med. Chem.* **2003**, *11*, 4807.
- [36] Assis S. P. O., Silva M. T., Oliveira R. N., *Sci. World J.* **2012**, *1*.
- [37] a) Biagi G., Dell’Omodarme G., Ferretti M., *Farmaco*. **1999**, *47*, 335.
- [38] Santos F. C., Castro H. C., Lourenc ,o M. C., *Curr. Microbiol.* **2012**, *65*, 455.

- [39] Kelley J. L., Koble C. S., Davis R. G., *J. Med. Chem.* **1995**, 38, 4131.
- [40] Bakunov S. A., Bakunova S. M., Wenzler T., *J. Med. Chem.* **2010**, 53, 254.
- [41] Monceaux C. J., Hirata-Fukae C., Lam P. C., *Med. Chem. Lett.* **2011**, 21, 3992.
- [42] Wuest F., Tang X., Kniess T., *Bioorg. Med. Chem.* **2009**, 17, 1146.
- [43] Yoon J., Cho L., Lee S. K., *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, 21, 1953.
- [44] Lo Conte M., Marra A., Chambery A., *J. Org. Chem.* **2010**, 75, 6326.
- [45] Campos V. R., Abreu P. A., Castro H. C., *Bioorg. Med. Chem.* **2009**, 17, 7429.
- [46] Tong W., Wu J. C., Sandstrom A., *Tetrahedron Lett.* **1990**, 46, 3037.
- [47] Domingos T. F. S., Moura L. A., Carvalho C., *BioMed. Res. Int.* **2013**, 1.
- [48] Raj R., Singh P., Singh P., *Eur. J. Med. Chem.* **2013**, 62, 590.
- [49] Tan S. L., Pause A., Shi V., Sonenberg N., *Nature Rev. Drug. Discov.* **2002**, 1, 867.
- [50] a) Prusiner P., Sundaralingam M., *Nat. New. Biol.* **1973**, 244, 116.
- [51] Smith R. A., Knight V., Smith J. A. D., (eds) *Clinical applications of ribavirin. Academic*, New York, **1984**.
- [52] Sidwell R. W., Revankar G. R., Robins R. K., *Pergamon, New York*, 49, **1985**.
- [53] Mydlak M., Bizzarri C., Hartmann D., Sarfert W., Schmid G., De Cola L., *Adv. Funct. Mater.* **2010**, 20, 1812.
- [54] Cai Z., Li B. T., Wong E. H., Weisman G. R., Anderson C. J., *Dalton Trans.* **2015**, 44, 3945.
- [55] Wamhoff H, In "*Comprehensive Heterocyclic Chemistry*", Pergamon: Oxford. 5, 669, **1984**.
- [56] Wu Y. M, Deng J, Fang X, Chen Q. Y., *Journal of Fluorine Chemistry*, **2004**, 125, 1415.
- [57] Rostovtsev V. V., Green L. G., Fokin V. V., Sharpless K. B., *Angew. Chem.* **2002**, 114, 2708.

- [58] R. Huisgen, *Angew. Chem.* **1963**, 75, 604; *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **1963**, 2, 565.
- [59] Quader S., Boyd S. E., Jenkins I. D., Houston T. A., *J. Org. Chem.* **2007**, 72, 1962.
- [60] Siemsen P., Livingston R. C., Diederich F., *Angew. Chem.* **2000**, 112, 2740; *Angew. Chem. Int. Ed.* **2000**, 39, 2632.
- [61] Evans R. A., *Aust. J. Chem.* **2007**, 60, 384.
- [62] Golas P. L., Matyjaszewski K., *Chem. Soc. Rev.* **2010**, 39, 1338.
- [63] Hua Y., Flood A. H., *Chem. Soc. Rev.* **2010**, 39, 1262.
- [64] Liang L., Astruc D., *Chem. Rev.* **2011**, 255, 2933.
- [65] He X., Xie P., Tang Y., *Curr. Med. Chem.* **2012**, 19, 2399.
- [66] Rodionov V. O., Fokin V. V., Finn M. G., *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **2005**, 44, 2210.
- [67] Fokin K. B., Fokin V. V., *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, 127, 210.
- [68] Ahlquist M., Fokin V. V., *Organometallics*, **2007**, 26, 4389.
- [69] Worrell B. T., J. A. Malik, V. V. Fokin, *Science*, **2013**, 340, 457.
- [70] Nikić I., J. Kang H., Girona G. E., *Nat. Protocol*, **2015**, 10, 780.
- [71] Zhengxin C., Wong L., Edward H., *Dalton Trans*, **2015**, 14, 3945.
- [72] Shi Y., Wang X., Graff R. W., Phillip W. A., Gao H., *J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem* **2015**, 53, 239.
- [73] Gallagher T. F., Seibel G. L., Kassis S., Laydon J. T., Blumenthal M. J., Lee J. C., Lee D., Boehm J. C., Fier-Thompson S. M., Abt J. W., *Bioorg. Med. Chem.* **1997**, 5, 49.
- [74] Claiborne C. F., Liverton N. J., Nguyen K. T., *Tetrahedron Lett.* **1998**, 39, 8939.

- [75] Liverton N. J., Butcher J. W., Claiborne C. F., Claremon D. A., Libby B. E., Nguyen K. T., Pitzenberger S. M., Selnick H. G., Smith G. R., Tebben, *Med. Chem.* **1999**, 42, 2180.
- [76] Lozinskaya N. A., Tsybezova V. V., Proskurnina M. V., Zefirov N. S., *Russ. Chem. Bull.* **2003**, 52, 674.
- [77] Yadav J. S., Subba Reddy B. V., Reddy G. M., Chary D. N., *Tetrahedron Lett.* **2007**, 48, 8773.
- [78] Ferreira V. F., da Rocha D. R., da Silva F. C., Ferreira P. G., Boechat N. A., Magalhães J. L., *Expert Opin. Ther. Patents*, **2013**, 23, 319.
- [79] Sztanke K., Pasternak K., Rzymowska J., Sztanke M., Kandefer-Szerszeń M., *Eur. J. Med. Chem.* **2008**, 43, 1085.
- [80] Walters T., Aur R., Hernandez K., Vietti T., Pinkel D., *Cancer*, **1972**, 29, 1057.
- [81] Falke D., Rada B., *Acta Virol*, **1970**, 14, 115.
- [82] Matolcsy G., *Acta Phytopathol*, **1996**, 1, 245.
- [83] Abdel-Rahman R.M., *Pharmazie*, **2001**, 56, 275.
- [84] Ali T., Abdel-Aziz S., El-Shaaer H., Hanafy F., El-Fauomy, A. *Elem* **2008**, 183, 2139.
- [85] Heravi M. M., bakavoli M., *j. Research in sci. and Ind.*, **1990**, 28.
- [86] Heravi M. M., Aghapoor K., Nooshabadi M. A., Mojtahedi M. M., *Monatshefte für Chemie*, **1997**, 128, 1143.
- [87] Furniss B. S., Hannaford A. J., Smith P. W. G., Tatchell A. R., in: "*Vogel's Textbook of practical organic chemistry - 5th ed*", Longman Group UK Limited, 920, **1989**.
- [88] Bräse S., Gil C., Knepper K., Zimmermann V., *Angew Chem. Int. Ed.* **2005**, 44, 5188.

Abstract

Reaction of 6-methyl-3-thioxo-3,4-dihydro-1,2,4-triazin-5(2H)-one and 1,2-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazine-3(4H)-thione with propargyl bromide, afforded 6-methyl-3-(prop-2-ynylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one and 3-(prop-2-ynylthio)-1,4-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazine respectively. Treatment of these prepared compounds with aromatic azides in the presence of copper(II)acetate and sodium ascorbate in DMF or EtOH produced new derivative of 1,2,3-triazole-linked 1,2,4-triazine and 1,2,4-benzotriazine with good-to-high yields.

In continue novel 1,2,3-triazole beased on the mention heterocyclic scaffolds were prepared using aliphatic halides, sodium azide and realated acetylenic compounds via copper-catalyzed click reaction.

Keywords: 1,2,3-triazole, copper (II) acetate, sodium azide, 1,2,4-triazine, aliphatic halide.



Shahrood University of Technology

Faculty of Chemistry

M. Sc. Thesis in Organic Chemistry

**Synthesis of new 1,2,3-triazoles from acetylenic triazine and
benzotriazine compounds**

Mostafa Lotfi

Supervisor:

Dr. Ali Keivanloo

Adviser:

Prof. Mohammad Bakherad

Desember 2015